



දෙවන වාර පරීක්ෂණය - 12 ශ්‍රේණිය - 2020

Second Term Test - Grade 12 - 2020

විභාග අංකය

රසායන විද්‍යාව I

කාලය පැය දෙකයි

සැලකිය යුතුයි

- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය සමඟ ආවර්තිතා වගුවක් සපයා ඇත.
- ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ දෙනු නොලැබේ.
- සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- උත්තර පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ විභාග අංකය ලියන්න.
- 1 සිට 50 තෙක් වූ එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරුවලින් නිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැලපෙන හෝ තෝරාගෙන , එය උත්තර පත්‍රයේ පිටුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි කතිරයක් යොදා දක්වන්න.

සාර්වත්‍ර වායු නියතය $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$ / ඇවගාඩ්රෝ නියතය $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ / ප්ලාන්ක් නියතය $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ JS}$ /
 ආලෝකයේ ප්‍රවේගය $C = 3 \times 10^8 \text{ mS}^{-1}$

1. පහත දැක්වෙන I හා II ප්‍රකාශ සලකන්න.

I - පිරිහුණු කාක්ෂිකවල ශක්තිය අවම වන්නේ සමාන භ්‍රමණයකින් යුත් ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව උපරිම වන විටය.

II - යම් පරමාණුවක ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකටම එකම ක්වොන්ටම් අංක කුලකයක් පැවතිය නොහැක.

මෙම I සහ II ප්‍රකාශ වලින් දෙනු ලබන නීති ඉදිරිපත් කළ විද්‍යාඥයන් දෙදෙනා පිළිවෙලින්,

1. අර්නස්ට් රදර්ෆර්ඩ් සහ හෙන්රි බෙකරල්
2. අර්නස්ට් රදර්ෆර්ඩ් සහ හුන්ඩ්
3. නීලස් බෝර් හා වොල්ෆ්ගැංග් පව්ලි
4. හුන්ඩ් සහ වොල්ෆ්ගැංග් පව්ලි
5. හුන්ඩ් හා ඩී බ්‍රෝග්ලි


2. පරමාණුවක ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය $n = 4$ හා ආශ්‍රිත උපරිම කාක්ෂික සංඛ්‍යාව වනුයේ,

1. 16
2. 14
3. 12
4. 9
5. 4

3. නයිට්‍රෝජන් අයන $[N^+O_2 / (O - N - O)^+]$ ට ඇඳිය හැකි සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ ගණන වනුයේ,

1. 2
2. 3
3. 4
4. 5
5. 6

4. පහත දී ඇති සංයෝගයේ IUPAC නාමය කුමක්ද?



1. iron(II) carbonate
2. iron carbonate
3. iron(II) dicarbontetroxide
4. iron(III) oxalate
5. iron(II) oxalate

5. විද්‍යුත් සෘණතාවේ වැඩිම වෙනසක් ඇති මූලද්‍රව්‍ය යුගලය හඳුනාගන්න.

1. C හා P
2. C හා N
3. Si හා N
4. C හා Si
5. B හා Si



6. $(NH_2)_2CO$ අණුවේ (සැකිල්ල: $\begin{array}{c} H & O & H \\ | & | & | \\ H-N^1-C^2-N-H \end{array}$) නයිට්‍රජන් සහ කාබන් යන පරමාණු දෙක අවට

(N^1 හා C^2 ලෙස ලේබල් කර ඇත.) ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය හා හැඩය පිළිවෙලින් වනුයේ,

	N^1		C^2	
(1)	චතුස්තලය	පිරමීඩාකාර	තලය ත්‍රිකෝණාකාර	තලය ත්‍රිකෝණාකාර
(2)	චතුස්තලය	පිරමීඩාකාර	තලය ත්‍රිකෝණාකාර	කෝණික
(3)	පිරමීඩාකාර	තලය ත්‍රිකෝණාකාර	තලය ත්‍රිකෝණාකාර	කෝණික
(4)	තලය ත්‍රිකෝණාකාර	පිරමීඩාකාර	තලය ත්‍රිකෝණාකාර	තලය ත්‍රිකෝණාකාර
(5)	චතුස්තලය	පිරමීඩාකාර	කෝණික	තලය ත්‍රිකෝණාකාර

7. පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතරින් ඕසෝන් පිළිබඳව වැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

1. ඕසෝන්හි මධ්‍ය පරමාණුව sp^2 මුහුම්කරණය වී ඇත.
2. ඕසෝන්හි ඕනෑම ඔක්සිජන් පරමාණු දෙකක් අතර බන්ධන දිග එකම අගයක් ගනී.
3. ඕසෝන්හි $O-O-O$ බන්ධන කෝණය 120° ට වඩා කුඩාය.
4. ඕසෝන්හි සම්ප්‍රයුක්ත මුහුම පහත දී ඇති ආකාරයට පෙන්වනු ලැබේ.



5. ඕසෝන්හි ඔක්සිජන් පරමාණු සියල්ලම එකම තලයක පිහිටයි.

8. MnO_2 , සාන්ද්‍ර HCl සමඟ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් $MnCl_2, Cl_2$ හා H_2O ලබා දේ. සංශුද්ධ MnO_2 43.5 g හා HCl 1.2 mol අඩංගු ද්‍රාවණයක් ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට සැලසූ විට, සම්පූර්ණයෙන් වැයවන ප්‍රතික්‍රියකය (මෙය සීමාකාරී ප්‍රතික්‍රියකය ලෙස සාමාන්‍යයෙන් හැඳින්වේ.) හා $Cl_2(g)$ සෑදෙන ප්‍රමාණ පිළිවෙලින් වනුයේ, (මවුලික ස්කන්ධ, $Mn = 55 \text{ g mol}^{-1}, O = 16 \text{ g mol}^{-1}, H = 1 \text{ g mol}^{-1}, Cl = 35.5$)

1. MnO_2 සහ 21.3 g
2. HCl සහ 21.3 g
3. MnO_2 සහ 35.5 g
4. HCl සහ 35.5 g
5. HCl සහ 85.2 g

9. පරිපූර්ණ වායු සමීකරණය, $P = CRT$ ආකාරයෙන් දැක්විය හැක. මෙහි C යනු සාන්ද්‍රණය ද, P යනු පීඩනය (Pa) හා T යනු උෂ්ණත්වය (K) ද වේ. R හි ඒකක $J \text{ mol}^{-1} K^{-1}$ නම්, සමීකරණයේ C හි ඒකක විය යුත්තේ,

1. mol cm^{-3}
2. mmol dm^{-3}
3. mmol m^{-3}
4. mol dm^{-3}
5. mol m^{-3}

10. හයිඩ්‍රජන්ඩවල ද්‍රවාංකය අඩුවන පිළිවෙල වනුයේ,

1. $HF > H_2O > NH_3 > CH_4$
2. $H_2O > HF > NH_3 > CH_4$
3. $H_2O > NH_3 > HF > CH_4$
4. $CH_4 > NH_3 > HF > H_2O$
5. $HF > H_2O > CH_4 > NH_3$

11. NH_2^-, NH_3, NH_4^+ සහ NCl_3 යන රසායනික විශේෂ නයිට්‍රජන් පරමාණුවේ (N) විද්‍යුත් ඍණතාව වැඩිවන පිළිවෙලට සැකසූ විට නිවැරදි පිළිතුර වනුයේ,

1. $NH_2^- < NH_3 < NH_4^+ < NCl_3$
2. $NH_2^- < NCl_3 < NH_3 < NH_4^+$
3. $NH_2^- < NH_3 < NCl_3 < NH_4^+$
4. $NH_4^+ < NH_3 < NCl_3 < NH_2^-$
5. $NH_4^+ < NCl_3, NH_3, < NH_2^-$

12. පහත සඳහන් කුමන පිළිතුර 25°C හි ඇති H_2 හා O_2 යන වායුන්ගේ වර්ග මධ්‍යන්‍ය මූල වේග අතර අනුපාතය ලබා දෙයි ද? ($H = 1, O = 16$)
1. $\frac{1}{4}$
 2. 16
 3. $\frac{1}{16}$
 4. 4
 5. 2
13. පහත දක්වා ඇති ප්‍රතික්‍රියාවේ එල වනුයේ,
 $\text{Mg}(s) + \text{සාන්ද්‍ර } \text{HNO}_3(aq) \rightarrow$ එල
1. $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2(aq) + \text{NO}_2(g) + \text{H}_2\text{O}(l)$
 2. $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2(aq) + \text{NO}(g) + \text{H}_2\text{O}(l)$
 3. $\text{Mg}(\text{NO}_2)_2(aq) + \text{NO}_2(g) + \text{H}_2\text{O}(l)$
 4. $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2(aq) + \text{H}_2(g) + \text{H}_2\text{O}(l)$
 5. $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2(aq) + \text{HNO}_2(aq) + \text{H}_2\text{O}(l)$
14. පහත දක්වන ඒවායින් නිවැරදි ප්‍රකාශය හඳුනාගන්න.
1. H_2S හි බන්ධන කෝණය H_2O හි බන්ධන කෝණයට වඩා විශාල වේ.
 2. 15 කාණ්ඩයේ ඕනෑම මූලද්‍රව්‍යයකට සෑදිය හැකි උපරිම σ බන්ධන සංඛ්‍යාව 5 කි.
 3. දෙවන කාණ්ඩයේ සියලු මූල ද්‍රව්‍ය වායුගෝලයේ දී $\text{N}_2(g)$ සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි.
 4. වැඩිපුර O_2 වායුව හමුවේ Li , Li_2O_2 සාදයි.
 5. Al සාදන අසම්පූර්ණ අෂ්ඨක සහිත සංයෝග ජලීය ද්‍රාවණයේ දී ද්වි අවයවික සාදයි.
15. 298 K දී පහත දී ඇති දත්ත සලකන්න.
- $$\frac{1}{2} \text{N}_2(g) + \frac{1}{2} \text{O}_2(g) \rightarrow \text{NO}(g) \quad \Delta H^{\circ} = 90.25 \text{ kJ mol}^{-1}$$
- $$\frac{1}{2} \text{N}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow \text{NO}_2(g) \quad \Delta H^{\circ} = 33.18 \text{ kJ mol}^{-1}$$
- ඉහත දත්ත අනුව,
- $$\text{NO}(g) + \frac{1}{2} \text{O}_2(g) \rightarrow \text{NO}_2(g)$$
- යන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා ΔH° හි අගය වනුයේ,
1. $-57.07 \text{ kJ mol}^{-1}$
 2. $57.07 \text{ kJ mol}^{-1}$
 3. $123.43 \text{ kJ mol}^{-1}$
 4. $-123.43 \text{ kJ mol}^{-1}$
 5. $23.89 \text{ kJ mol}^{-1}$
16. A නමැති ද්‍රව්‍ය වාෂ්පීකරණයේ දී පහත සමතුලිතතාව හට ගනී.
- $$\text{A}(l) \rightleftharpoons \text{A}(g)$$
- මෙම ද්‍රවයේ වාෂ්පීකරණයේ එන්තැල්පි වෙනස හා වාෂ්පීකරණයේ එන්ට්‍රොපි වෙනස පිළිවෙලින් $44.76 \text{ kJ mol}^{-1}$ හා $120.0 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ වේ. ද්‍රවයෙහි තාපාංකය වනුයේ,
1. 493°C
 2. 275.6°C
 3. -272.6°C
 4. 373°C
 5. 100°C
17. කාබන් (C) වල බහුරූපී ආකාර පිළිබඳව වැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?
1. දියමන්ති, මිනිරන් සම පරමාණුක දැලිස් ව්‍යුහ වලින් සමන්විත වේ.
 2. මිනිරන් හොඳ විද්‍යුත් සන්නායකයක් මෙන්ම තාප සන්නායකයක් ද වේ.
 3. මිනිරන් ත්‍රිමාන දැලිසක් වන අතර, මිනිරන් හි C sp^2 මුහුම්කරණයේ පවතී.
 4. මිනිරන්වල C - C බන්ධන දිග දියමන්තිවල C - C බන්ධන දිගට වඩා අඩුය.
 5. හුලරිත්වල C පරමාණු ගෝලාකාරව එකිනෙකට සම්බන්ධ වී පවතී.
18. කිසියම් උෂ්ණත්වයක දී $\text{SO}_2(g)$, $\text{O}_2(g)$ සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර එල ලෙස $\text{SO}_3(g)$ පමණක් ලබා දේ. නියත පීඩනයක දී හා අදාළ උෂ්ණත්වයේ දී $\text{SO}_2(g)$ 8 dm^3 හා $\text{O}_2(g)$ 10 dm^3 ක් ප්‍රතික්‍රියාකල විට මිශ්‍රණයේ අවසාන පරිමාව වනුයේ,
1. 18 dm^3
 2. 10 dm^3
 3. 20 dm^3
 4. 14 dm^3
 5. 13 dm^3




19. රේඛනය කරන ලද දෘඩ බඳුනක් තුළට $A(g)$ හා $D(g)$ හි මිශ්‍රණයක් උෂ්ණත්වය T හි දී ඇතුල් කරන ලදී. මෙම උෂ්ණත්වයේ දී $A(g)$ හා $D(g)$ යන දෙකම පහත දී ඇති ප්‍රතික්‍රියා අනුව විශෝජනය වේ.
- $$2A(g) \rightarrow B(g) + 3C(g)$$
- $$D(g) \rightarrow B(g) + 2C(g)$$
- බඳුනෙහි ආරම්භක පීඩනය P , ප්‍රතික්‍රියක දෙක සම්පූර්ණයෙන් විශෝජනය වූ පසු $2.7P$ දක්වා වෙනස් විය. මෙම උෂ්ණත්වයේ දී $A(g)$ හා $D(g)$ හි ආරම්භක ආංශික පීඩන අතර අනුපාතය වනුයේ,
1. $2/1$
 2. $10/3$
 3. $1/27$
 4. $3/10$
 5. $3/7$
20. පහත සිළු පරික්ෂාවේ දී නිල්දම් පැහැයක් ගෙන දෙන්නේ,
1. $LiCl$
 2. $NaCl$
 3. $CaCl_2$
 4. $CsCl$
 5. KCl
21. ආම්ලික මාධ්‍යයේ දී H_2O_2 ද්‍රාවණයකින් 25 cm^3 ඔක්සිකරණය සඳහා 0.1 mol dm^{-3} $KMnO_4$ ද්‍රාවණ 20 cm^3 ක් අවශ්‍ය වේ. H_2O_2 හි සාන්ද්‍රණය වනුයේ, ($MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+}$, $H_2O_2 \rightarrow O_2$)
1. 0.08 mol dm^{-3}
 2. 0.2 mol dm^{-3}
 3. 0.016 mol dm^{-3}
 4. 0.125 mol dm^{-3}
 5. 0.4 mol dm^{-3}
22. පහත අණු සලකන්න.
- $$NF_3, CF_2Cl_2, OCl_2$$
- ඉහත සෑම අණුවකම මධ්‍ය පරමාණුව වටා පිහිටන පරමාණු වෙනුවට H පරමාණු ආදේශ කළහොත් එක් එක් අණුවේ මධ්‍ය පරමාණුවේ ඔක්සිකරණ අංකය පිළිවෙලින්,
1. වැඩිවේ, වෙනස් නොවේ, අඩුවේ
 2. වෙනස් නොවේ, වෙනස් නොවේ, වෙනස් නොවේ.
 3. අඩුවේ, වැඩිවේ, වෙනස් නොවේ
 4. අඩුවේ, අඩුවේ, වෙනස් නොවේ
 5. අඩුවේ, අඩුවේ, වැඩිවේ
23. පහත වගන්ති වලින් වැරදි වගන්තිය වනුයේ,
1. $NaOH$ වල භාස්මිකතාවය $Mg(OH)_2$ වල භාස්මිකතාවයට වඩා වැඩිය.
 2. පළමු කාණ්ඩයේ පහළට යත්ම හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්වල සහසංයුජ ස්වභාවය වැඩිවේ.
 3. $NaCl$ ට වඩා NaI හි ජල ද්‍රාව්‍යතාවය වැඩි ය.
 4. Al හි හයිඩ්‍රොක්සයිඩය හස්ම සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි.
 5. Al හි හයිඩ්‍රොක්සයිඩය අම්ල සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි.
24. එක්තරා $NaCl$ ද්‍රාවණයක සාන්ද්‍රණය $1 \times 10^{-3}\text{ mol dm}^{-3}$ වේ. එහි සංයුතිය ppm වලින් වනුයේ, ($Na = 23, Cl = 35.5$)($1\text{ ppm} = 1\text{ mg dm}^{-3}$)
1. 58.5×10^{-3}
 2. 0.585
 3. 5.85
 4. 58.5
 5. 585
25. KIO_3 අඩංගු නියැදියකින් $1g$ දියකර සාදාගත් ද්‍රාවණයක් වැඩිපුර KI අඩංගු ආම්ලික ද්‍රාවණයක් සමග පිරියම් කරන ලදී. මුක්ත වූ අයඩින් 0.003 mol dm^{-3} $Na_2S_2O_3$ ද්‍රාවණයක් හා ප්‍රතික්‍රියා කරවන ලදී. අවශ්‍ය වූ $Na_2S_2O_3$ පරිමාව 25 cm^3 විය. නියැදියේ වූ KIO_3 හි සක්න්ධ ප්‍රතිශතය වනුයේ, ($KIO_3 = 214$)
(මෙහිදී $H^+ / IO_3^- \rightarrow I_2$ සහ $I^- \rightarrow I_2$, $S_2O_3^{2-} + I_2 \rightarrow S_4O_6^{2-} + I^-$)
1. 1.605×10^{-2}
 2. 1.605
 3. 3.21
 4. 2.675×10^{-3}
 5. 2.675×10^{-1}



26. $MgO(s)$ උත්පාදනයට අදාළ බෝන්- හේබර් චක්‍රයෙහි අඩංගු නොවන්නේ පහත සහන් කුමන ප්‍රතික්‍රියා පියවරද?

1. $Mg(s) \rightarrow Mg(g)$ 2. $\frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow O(g)$ 3. $Mg^{2+}(aq) + O^{2-}(aq) \rightarrow MgO(s)$
4. $O(g) + e \rightarrow O^-(g)$ 5. $Mg(s) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow MgO(s)$


27. CO_2 හි කලාප සටහන පහත දැක්වේ.



CO_2 හි අවධි උෂ්ණත්වය වනුයේ,

1. $30.98^\circ C$ 2. $25.0^\circ C$ 3. $0^\circ C$ 4. $-56.4^\circ C$ 5. $-78.5^\circ C$

28. $300K$ දී වායු හතරක් සඳහා මැක්ස්වෙල් බෝල්ට්ස්මාන් වේග ව්‍යාප්තිය පහත දැක්වේ.



මෙම A, B, C, D වායු හතර පිළිවෙලින් වනුයේ,

1. $H_2(g), N_2(g), O_2(g), Cl_2(g)$ 2. $Cl_2(g), O_2(g), N_2(g), H_2(g)$
3. $H_2(g), N_2(g), Cl_2(g), O_2(g)$ 4. $H_2(g), Cl_2(g), N_2(g), O_2(g)$
5. $O_2(g), Cl_2(g), N_2(g), H_2(g)$

29. දෙවන හා තුන්වන ආවර්තවල මූලද්‍රව්‍යවල ඉලෙක්ට්‍රෝන කරණ එන්තැල්පිය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

1. සම්මත අවස්ථාවේ ඇති වායුමය අණු මවුලයක් ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුලයක් ප්‍රතිග්‍රහණය කර සම්මත අවස්ථාවේ ඇති ඒක සෘණ අයන මවුලයක් සෑදීමේ දී සිදුවන එන්තැල්පි වෙනසයි.
2. F වඩාත් විද්‍යුත් සෘණ බැවින් එයට ඉහළම ඉලෙක්ට්‍රෝන කරණ එන්තැල්පිය ඇත.
3. ඉහළම ඉලෙක්ට්‍රෝනකරණ එන්තැල්පිය ඇත්තේ Cl ටය.
4. මෙය ඉලෙක්ට්‍රෝන බන්ධුතාවය ලෙස ද හැඳින්වේ.
5. Mg වැනි පරමාණුවකට අර්ධ පූර්ණ ස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයක් ඇති බැවින් ඉලෙක්ට්‍රෝනකරණ එන්තැල්පිය සෘණ අගයක් වේ.

30. පහත සම්මුතීන් අතරින් නිවැරදි වන්නේ,

1. සමස්ථ තාප රසායනික සමීකරණයක් කිසියම් සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කරන ලද්දේ නම්, එන්තැල්පි වෙනස ද එම සංඛ්‍යාවෙන් ගුණ කළ යුතුය.
2. ප්‍රතික්‍රියාවක එන්තැල්පි විපර්යාසයේ ඒකකය ප්‍රතික්‍රියාවට සහභාගි වන මවුල ගණන අනුව වෙනස් වේ.
3. ප්‍රතික්‍රියාවක් ප්‍රතිවර්තනය කළ විට ΔH හි සලකුණ හා විශාලත්වය යන දෙකම මාරු වේ.
4. ΔH හි අගය ප්‍රතික්‍රියකවල හා ඵලවල භෞතික අවස්ථාව අනුව වෙනස් නොවේ.
5. ΔH^θ හි සලකුණ සෘණ වේ නම්, ප්‍රතික්‍රියාව තාප අවශෝෂක වේ.

- අංක 31 සිට 40 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති (a), (b), (c) සහ (d) යන ප්‍රතිචාර හතර අතුරෙන් එකක් හෝ වැඩි සංඛ්‍යාවක් හෝ නිවැරදිය. නිවැරදි ප්‍රතිචාරය / ප්‍රතිචාර කවරේ දැයි තෝරා ගන්න.

- (a) සහ (b) පමණක් නිවැරදි නම් (1) මත ද
 (b) සහ (c) පමණක් නිවැරදි නම් (2) මත ද
 (c) සහ (d) පමණක් නිවැරදි නම් (3) මත ද
 (a) සහ (d) පමණක් නිවැරදි නම් (4) මත ද

වෙනත් ප්‍රතිචාර සංඛ්‍යාවක් හෝ සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදි නම් (5) මත ද උත්තර පත්‍රයෙහි දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි ලකුණු කරන්න.

ඉහත උපදෙස් සම්පිණ්ඩනය

1	2	3	4	5
(a) සහ (b) පමණක් නිවැරදියි	(b) සහ (c) පමණක් නිවැරදියි	(c) සහ (d) පමණක් නිවැරදියි	(d) සහ (a) පමණක් නිවැරදියි	වෙනත් ප්‍රතිචාර සංඛ්‍යාවක් හෝ සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදියි

31. s ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය සාදන සංයෝග පිළිබඳව පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ නිවැරදි වේද?

- (a) දෙවන කාණ්ඩයේ සියලු බයිකාබනේට් (හයිඩ්‍රජන් කාබනේට්) ඝන තත්වයෙන් ගත හැක.
- (b) $LiHCO_3$ ඝන තත්වයෙන් ලබා ගත නොහැක.
- (c) දෙවන කාණ්ඩයේ සියලු කාබනේට් තාපයට අස්ථායී වේ.
- (d) $NaNO_3$ තාපය හමුවේ වියෝජනයෙන් $NO_2(g)$ ලබා ගත හැක.

32. පහත කුමන වගන්තිය සත්‍ය වේද?

- a) එන්තැල්පිය අවස්ථා ශ්‍රිතයක් වන අතර විත්ති ගුණයකි.
- b) තාපන අවස්ථා ශ්‍රිතයක් නොවන අතර සටනා ගුණයකි.
- c) ඝනත්වය විත්ති ගුණයක් වේ.
- d) මවුලික එන්තැල්පිය අවස්ථා ශ්‍රිතයක් වන අතර සටන ගුණයකි.

33. අදාළ එන්තැල්පි විපර්යාසය හා නිවැරදි සමීකරණය දැක්වෙන්නේ,

- (a) සම්මත පරමාණුක එන්තැල්පිය $Cl_2(g) \rightarrow 2Cl(g)$
- (b) සම්මත ද්‍රාවණ එන්තැල්පිය $NaCl(aq) \rightarrow NaCl(s) + \text{water}$
- (c) සම්මත උදාසීනීකරණ එන්තැල්පිය $H^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow H_2O(l)$
- (d) සම්මත විලයන එන්තැල්පිය $Al(s) \rightarrow Al(l)$



34. පහත ප්‍රතික්‍රියා අතරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද? කුමන ඒවාද?
- $2 Na(s) + H_2(g) \rightarrow 2 NaH(s)$
 - $6 Na(s) + N_2(g) \rightarrow 2 Na_3N(s)$
 - $4 NaNO_3(s) \rightarrow 2 Na_2O(s) + 4 NO_2(g) + O_2(g)$
 - $2 LiNO_3(s) \rightarrow 2 LiNO_2(s) + O_2(g)$
35. දෙවන කාණ්ඩයේ ලවණවල ද්‍රාව්‍යතාවය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ,
- $BeCO_3$ හැර සියලු කාබනේට් අද්‍රාව්‍ය වේ.
 - සියළු සල්ෆේට් අද්‍රාව්‍ය වේ.
 - කාණ්ඩයේ පහළට යත්ම සල්ෆේට් වල ද්‍රාව්‍යතාව අඩුවේ.
 - සියලු නයිට්‍රේට් ද්‍රාව්‍ය වේ.
36. විත්ති ගුණයක් වන්නේ,
- පරිමාව
 - මවුල ප්‍රමාණය
 - උෂ්ණත්වය
 - මවුලික පරිමාව
37. විද්‍යුත් චුම්භක තරංග සම්බන්ධයෙන් පහත කුමන ප්‍රකාශය නිවැරදි වේද?
- රික්තය තුළ ආලෝකය වේගයෙන් ප්‍රචාරණය වේ.
 - මේවායේ විද්‍යුත් හා චුම්භක ක්ෂේත්‍ර දෙකෙහි දෝලන තරංග ප්‍රචාරණය වන දිශාවට සමාන්තර වේ.
 - විවිධ විද්‍යුත් චුම්භක විකිරණ එකිනෙකින් වෙනස් වන්නේ ඒවායේ වේග එකිනෙකට වෙනස් නිසාය.
 - මෙම තරංග ආවර්තිත වේ.
38. සහසංයුජ, අයනික හා දායක සහසංයුජ යන බන්ධන සියල්ල අඩංගු අණුවක් / අණු වන්නේ,
- $NaNO_2$
 - $NaNO_3$
 - $(NH_4)_2CO_3$
 - NH_3BF_3
39. $2 H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2 H_2O(g); \Delta H^\theta = -483.7 kJ mol^{-1}$
ඉහත තාප රසායනික සමීකරණයෙන් අර්ථකථනය කළ හැක්කේ,
- ප්‍රතික්‍රියා මවුලයකට $483.7 kJ$ ක් නිදහස් වේ.
 - වැයවන $H_2(g)$, මවුල 2 කට $483.7 kJ$ නිදහස් වේ.
 - වැයවන $H_2(g)$, මවුල 1 කට $483.7 kJ$ නිදහස් වේ.
 - සෑදෙන ජල වාෂ්ප මවුල 1 කට $483.7 kJ$ නිදහස් වේ.
40. ලෝහක බන්ධන සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ,
- ධන අයන විශාලත්වම ලෝහක බන්ධනයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සන්නත්වය වැඩිවේ.
 - දැලිස ස්ථායීවන පරිදි සවල ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව සමස්ථ දැලිස පුරා අනවරතව වලනය වේ.
 - පරමාණුවකින් සපයන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන වැඩිත්ම ලෝහක බන්ධනයේ ප්‍රබලතාව වැඩිවේ.
 - ක්ෂාරීය ලෝහ හා ක්ෂාර පාංශු ලෝහවල දී පරමාණුවේ අයනික ස්වභාවය ලෝහක බන්ධනය සඳහා ප්‍රබල බලපෑමක් කරයි.



- අංක 41 සිට 50 තෙක් එක් ප්‍රශ්නයක් සඳහා ප්‍රකාශ දෙකක් ඉදිරිපත් කර ඇත. එම ප්‍රකාශ යුගලම හොඳින්ම ගැලපෙනුයේ පහත දැක්වෙන පරිදි (1), (2), (3), (4) සහ (5) යන ප්‍රතිචාර වලින් කවර ප්‍රතිචාරය දැයි තෝරා උත්තර පත්‍රයේ උචිත ලෙස ලකුණු කරන්න.

ප්‍රතිචාරය	පළමුවැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
1	සත්‍යය	සත්‍ය වන අතර පළමු ප්‍රකාශය නිවැරදිව පහදා දෙයි
2	සත්‍යය	සත්‍ය වන අතර පළමු ප්‍රකාශය නිවැරදිව පහදා නොදේ
3	සත්‍යය	අසත්‍යය
4	අසත්‍යය	සත්‍යය
5	අසත්‍යය	අසත්‍යය

	පළමු ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
41.	Br_2 ට වඩා ICl හි තාපාංකය වැඩිය.	Br_2 නිර්ධෘතීය අණුවකි. ICl ධූතීය අණුවකි. එහි ද්විධ්‍රැව ද්විධ්‍රැව ආකර්ෂණ පවතී.
42.	කැතෝඩ කිරණ වුම්හක ක්ෂේත්‍රයේ දී වුම්හක ධ්‍රැව වෙතට උත්ක්‍රමණය වේ.	කැතෝඩ කිරණ සෘණ ආරෝපිතයි.
43.	බාමර් ශ්‍රේණියේ පළමු රේඛාවේ තරංග ආයාමය ලයිමාන් ශ්‍රේණියේ පළමු රේඛාවේ තරංග ආයාමයට වඩා අඩුය.	බාමර් සහ ලයිමාන් ශ්‍රේණි සැලකීමේ දී ඉහළ තරංග ආයාම පරාසයක පිහිටා ඇත්තේ ලයිමාන් ශ්‍රේණිය ය.
44.	එකම ආවර්තයේ වමේ සිට දකුණට යත්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන වැඩි වන නිසා නිවාරක ආවරණය වැඩිවේ.	එකම ආවර්තයේ වමේ සිට දකුණට යත්ම පරමාණුවල අරය අඩුවන නිසා සඵල න්‍යෂ්ටික ආරෝපණය අඩුවේ.
45.	රසායනික බන්ධන සෑදීම සඳහා සංයුජතා කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන සහභාගි වේ.	ඉලෙක්ට්‍රෝන හවුලේ තබා ගැනීමෙන් සහසංයුජ බන්ධන ඇතිවේ.
46.	තුලිත රසායනික සමීකරණයක දෙපස පිහිටි අණු සංඛ්‍යාව හා ආරෝපණය සමාන විය යුතුය.	තුලිත රසායනික සමීකරණයක දෙපස ස්කන්ධ සමානය.
47.	ද්‍රවයක් එය අඩංගු බඳුනේ හැඩය ගනී. නමුත් බඳුන පුරා පැතිරීමක් නොවේ.	ද්‍රවයක හැඩය කෙරෙහි ගුරුත්වජ බලය බලපායි.
48.	සාන්ද්‍රණය දන්නා ද්‍රාවණ පිළියෙල කිරීමට පරිමාමිතික ප්ලාස්කුව භාවිතා වේ.	අම්ලයක් තනුක කිරීමේ දී දන්නා අම්ල පරිමාවකට ජලය එකතු කිරීම සිදුවේ.
49.	ප්‍රබල අම්ල - ප්‍රබල හස්ම උදාසීනීකරණ එන්තැල්පිය නියතයකි.	දුබල අම්ල හා දුබල හස්ම වල උදාසීනීකරණ එන්තැල්පිය ප්‍රබල අම්ල හා හස්ම වලට වඩා තරමක් වෙනස් වේ.
50.	s ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය ඔක්සිහාරක ලෙස ක්‍රියා කරයි.	ඇතැම් තත්ත්ව යටතේ දී s ගොනුවේ I කාණ්ඩයේ ලෝහ ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබාගෙන ඔක්සිහරණය වේ.

ආවර්තිතා වගුව																	
ஆவர்த்தன அட்டவணை																	
Periodic Table																	
1	2															3	4
3	4															5	6
Li	Be															B	C
11	12															13	14
Na	Mg															Al	Si
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
55	56	La	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
Cs	Ba	Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
87	88	Ac	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113					
Fr	Ra	Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Uun	Uuu	Uub	Uut					

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr



Provincial Department of Education - NWP

දෙවන වාර පරීක්ෂණය - 12 ශ්‍රේණිය - 2020

Second Term Test - Grade 12 - 2020

විභාග අංකය

රසායන විද්‍යාව II

කාලය පැය තුනයි

- * ආවර්තිතා වගුවක් අවසාන පිටුවෙහි සපයා ඇත.
- * ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ දෙනු නොලැබේ.
- * සාර්වත්‍ර වායු නියතය, $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- * ඇවගාඩරෝ නියතය, $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

□ A කොටස - චක්‍රගත රචනා

- * සියලු ම ප්‍රශ්නවලට මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ම පිළිතුරු සපයන්න.
- * ඔබේ පිළිතුරු එක් එක් ප්‍රශ්නයට ඉඩ සලසා ඇති තැන්වල ලිවිය යුතු ය. මේ ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිතුරු ලිවීමට ප්‍රමාණවත් බව ද දීර්ඝ පිළිතුරු බලාපොරොත්තු නො වන බව ද සලකන්න.

□ B කොටස සහ C කොටස - රචනා

- * එක් එක් කොටසින් ප්‍රශ්න දෙක බැගින් තෝරා ගනිමින් ප්‍රශ්න හතරකට පිළිතුරු සපයන්න. මේ සඳහා සපයනු ලබන කඩදාසි භාවිත කරන්න.
- * සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු A, B සහ C කොටස්වලට පිළිතුරු, A කොටස මුලින් කිබෙන පරිදි එක් පිළිතුරු පත්‍රයක් වන සේ අමුණා විභාග ශාලාධිපතිට භාර දෙන්න.
- * ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි B සහ C කොටස් පමණක් විභාග ශාලාවෙන් පිටතට ගෙන යා හැකි ය.

පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි

කොටස	ප්‍රශ්න අංකය	ලැබූ ලකුණු
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
C	8	
	9	
	10	
එකතුව		
ප්‍රතිශතය		

අවසාන ලකුණු

ඉලක්කමෙන්	
අකුරින්	

සංකේත අංක

උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 1	
උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 2	
පරීක්ෂා කළේ :	
අධීක්ෂණය කළේ :	

[ලදවාහි පිටුව බලන්න.



A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

(01) a. I. පහත සඳහන් ප්‍රශ්න ආවර්තිතා වගුවේ තුන්වන ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය හා සම්බන්ධ වේ. කොටස් (i) සිට (v) දක්වා පිළිතුරු ලබා දීමේ දී ලබා දී ඇති අවකාශයේ මූලද්‍රව්‍යයේ සංකේතය ලියන්න.

i. අඩුම විද්‍යුත් සෘණතාව ඇති මූලද්‍රව්‍ය හඳුනාගන්න. (උච්ඡ වායුව නොසලකා හරින්න.)

.....

ii. ප්‍රමාණයෙන් කුඩාම ඒක පරමාණුක අයනය සාදන මූලද්‍රව්‍ය හඳුනාගන්න. (මෙම අයනය ස්ථායී විය යුතුය.)

.....

iii. p ඉලෙක්ට්‍රෝන නොමැති නමුත් ස්ථායී වින්‍යාසයක් ඇති මූලද්‍රව්‍ය හඳුනාගන්න.

.....

iv. දෙවැනියට වැඩිම පළමු අයනීකරණ ශක්තිය ඇති මූලද්‍රව්‍ය හඳුනාගන්න.


.....

v. වායුමය අවස්ථාවේ දී ද්වි අවයවික වශයෙන් පවතින ඉලෙක්ට්‍රෝන උෘත සංයෝග සාදන මූලද්‍රව්‍ය හඳුනා ගන්න.


.....

(b) $CH_2NO_2^-$ අයනය සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ලුවිස් තිත් - ඉරි ව්‍යුහය අඳින්න.

I. එහි සැකිල්ල පහත දක්වා ඇත.




II. H_3CN_2O අණුව සඳහා වඩාත්ම ස්ථායී ලුවිස් තිත් - ඉරි ව්‍යුහය පහත දක්වා ඇත. මෙම අණුව සඳහා තවත් ලුවිස් තිත් - ඉරි ව්‍යුහ (සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ) දෙකක් අඳින්න. ඔබ විසින් අඳින ලද වඩාත් අස්ථායී ව්‍යුහය යටින් 'අස්ථායී' ලෙස ලියන්න.




III. පහත සඳහන් ලුච්ස් තිත් - ඉරි ව්‍යුහය පදනම් කරගෙන වගුවේ ඇති C, N හා O පරමාණුවල,

- පරමාණුව වටා $VSEPR$ යුගල්
- පරමාණුව වට ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය
- පරමාණුව වටා හැඩය
- පරමාණුවේ මුහුම්කරණය සඳහන් කරන්න.
- පරමාණුවේ ඔක්සිකරණ අංකය සඳහන් කරන්න.



පහත දැක්වෙන පරිදි පරමාණු අංකනය කර ඇත.



	O^1	C^2	C^3	N^5
$VSEPR$ යුගල්				
ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය				
හැඩය				
මුහුම්කරණය				
ඔක්සිකරණ අංකය				

IV. ඉහත (III) කොටසෙහි ලුච්ස් තිත් - ඉරි ව්‍යුහයෙහි පහත සඳහන් σ බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක / මුහුම් කාක්ෂික හඳුනාගන්න. (පරමාණුවල අංකනය (III) කොටසෙහි ආකාරයටම වේ.)

- | | | | |
|------|-------------|-------------|-------------|
| i. | $H - O^1$ | H | O^1 |
| ii. | $O^1 - C^2$ | O^1 | C^2 |
| iii. | $C^2 - C^3$ | C^2 | C^3 |
| iv. | $C^3 - C^4$ | C^3 | C^4 |
| v. | $C^4 - N^5$ | C^4 | N^5 |
| vi. | $C^4 - O$ | C^4 | O |



V. ඉහත (III) කොටසෙහි දෙන ලද ලුච්ස් තීන් - ඉරි ව්‍යුහයෙහි පහත සඳහන් π බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක කාක්ෂික හඳුනාගන්න. (පරමාණුවල අංකනය (III) කොටසෙහි ආකාරයටම වේ.)

- I. $C^2 - C^3$ C^2 C^3
- II. $C^4 - O^6$ C^4 C^6

VI. i. ඉහත (III) කොටසෙහි දෙන ලද ලුච්ස් තීන් - ඉරි ව්‍යුහයෙහි ත්‍රිත්ව බන්ධනයේ π බන්ධන දෙක දිශානත වී ඇත්තේ කෙසේද?

.....

.....

ii. එකිනෙකට වෙනස් පරමාණු 2 ක් අතර ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් සහිත අණුවක් / අයනයක් සඳහා උදාහරණයක් දෙන්න.

.....

.....

සැ.යු. ඔබේ උදාහරණයෙහි පරමාණු 3 කට වඩා අඩංගු නොවිය යුතුයි.

ඔබ දෙන උදාහරණයේ ඇති මූලද්‍රව්‍ය ආවර්තිතා වගුවේ පළමුවන හා දෙවන ආවර්තවලට සීමා විය යුතුය.

(c) i. පරමාණුක කාක්ෂිකයක් විස්තර කරනුයේ n, l සහ m_l ක්වොන්ටම් අංක තුන මගිනි. අදාළ ක්වොන්ටම් අංක සහ පරමාණුක කාක්ෂිකයේ නම පහත දැක්වෙන කොටුවල ලියන්න.

1. -1 $4P$
2. 4 2 0
3. $3s$

ii. වරහන් තුළ දක්වා ඇති ගුණය වැඩිවන පිළිවෙලට පහත සඳහන් දෑ සකසන්න. (හේතු අවශ්‍ය නොවේ.)

I. $BeCO_3$, $MgCO_3$, $CaCO_3$ (වියෝජන උෂ්ණත්වය)

..... < <

II. N^+O_2 , NO_2 , NO_2^- ($ON\hat{O}$ බන්ධන කෝණය)

..... < <

III. C_2H_6 , C_2H_4 , C_2H_2 ($C - C$ බන්ධන දිග)

..... < <



(02) a. X යනු ආවර්තිතා වගුවේ s - ගොණුවේ මූලද්‍රව්‍යයකි. X හි පළමු දෙවැනි හා තුන්වැනි අයනීකරණ ශක්තීන් පිළිවෙලින් kJ mol^{-1} වලින්, 519, 7300, 11800. $\text{H}_2(\text{g})$ මුදා හරිමින් හා එහි හයිඩ්‍රොක්සයිඩය සාදමින් X ජලය සමඟ ප්‍රබල නොවන ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදු කරයි. හයිඩ්‍රොක්සයිඩය භාස්මික වේ. X තනුක අම්ල සමඟ ප්‍රතික්‍රියාවේ දී $\text{H}_2(\text{g})$ මුදා හැරේ. X වාතයේ දහනය වී සහ සංයෝග දෙකක මිශ්‍රණයක් ලබා දේ. එම සංයෝග දෙක ජලයට එක් කළ විට Y නැමැති භාස්මික වායුවක් පිටවේ.

i. X හඳුනාගන්න.

.....

ii. X හි භූමි අවස්ථාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වින්‍යාසය ලියන්න.

.....

iii. X වාතයේ දහනයේ දී සෑදෙන සංයෝග දෙකෙහි රසායනික සූත්‍ර ලියන්න.

..... හා

iv. s ගොණුවේ X අයත්වන කාණ්ඩය හැරුණු විට අනෙක් කාණ්ඩයෙහි මූලද්‍රව්‍යයන්හි දී ඇති සංයෝග සලකන්න. කාණ්ඩයේ පහළට යාමේ දී දක්වා ඇති ගුණය වැඩිවේ ද අඩුවේ ද යන්න දී ඇති කොටු තුළ සඳහන් කරන්න.

- සල්ෆයිටවල ජලයේ ද්‍රාව්‍යතාවය
- හයිඩ්‍රොක්සයිඩවල ජලයේ ද්‍රාව්‍යතාවය
- ලෝහ නයිට්‍රේටවල තාප ස්ථායීතාවය

3 හි ඔබගේ පිළිතුරට හේතුව දක්වන්න.

.....

v. $\text{H}_2(\text{g}), \text{O}_2(\text{g})$ හා $\text{N}_2(\text{g})$ සමඟ X ට බොහෝ දුරට සමාන ලෙස ප්‍රතික්‍රියා කරන නමුත් X අඩංගු කාණ්ඩයට අයත් නොවන ආවර්තිතා වගුවේ s - ගොණුවේ මූලද්‍රව්‍ය හඳුනාගන්න.

.....

vi. ඉහත Y නැමැති භාස්මික වායුව කුමක්ද?

.....

vi. Y හඳුනා ගැනීම සඳහා පරීක්ෂණයක් දෙන්න.

.....

vii. එම පරීක්ෂණයේ නිරීක්ෂණය කුමක්ද?

.....



- (b) A සිට E දක්වා නම් කර ඇති පරීක්ෂණ නල වල Na_2SO_4 , Na_2SO_3 , $NaOH$, K_2CrO_4 හා $Ca(NO_3)_2$ හි (පිළිවෙලින් නොවේ) ජලීය ද්‍රාවණ අඩංගු වේ. A සිට E දක්වා ඇති එක් එක් පරීක්ෂණ නලයට අදාළ පරීක්ෂණය හා අදාළ නිරීක්ෂණ පහත දී ඇත.

පරීක්ෂා නලය	පරීක්ෂණය	නිරීක්ෂණය
A	$BaCl_2$ ද්‍රාවණ ද්‍රාවණ 1 cm^3 එකතු කරන්න. ඉන්පසු තනුක HCl එකතු කරන්න.	සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක් ලැබී පසුව එය දියවේ.
B	$Mg(NO_3)_2$ ද්‍රාවණය එකතු කරන්න.	සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක් ලැබේ.
C	$BaCl_2$ ද්‍රාවණ 1 cm^3 පමණ එකතු කරන්න. ඉන්පසු ත. HCl එකතු කරන්න.	සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක් සෑදේ. එය දිය නොවේ.
D	Na_2CO_3 1 cm^3 ක් පමණ එකතු කරන්න.	සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක් ලැබේ.
E	$BaCl_2$ ද්‍රාවණ 1 cm^3 එකතු කරන්න.	කහ පැහැති අවක්ෂේපයක් ලැබේ.

- (i) A සිට E දක්වා පරීක්ෂා නල වල ද්‍රාවණ හඳුනාගන්න.

A B

C D

E

- (ii) A, B, C, D හා E පරීක්ෂණ නල වල සිදුවන ප්‍රතික්‍රියා සඳහා තුලිත රසායනික / අයනික සමීකරණය ලියන්න.

- (03) (a) I. විද්‍යාගාරයේ දී 1 moldm^{-3} Na_2CO_3 ද්‍රාවණ 250 cm^3 සෑදීම සඳහා සහ $Na_2CO_3 \cdot 5H_2O$ සපයා ඇත. ($Na = 23$, $C = 12$, $O = 16$, $H = 1$)

i. අවශ්‍ය කරන Na_2CO_3 mol ගණන කොපමණද?

ii කිරාගත යුතු $Na_2CO_3 \cdot 5H_2O$ ස්කන්ධය කොපමණද?

.....

.....

.....

.....

.....



iii. ප්‍රාමාණික ද්‍රාවණයක් යනු කුමක්ද?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

iv. ප්‍රාථමික සම්මත ද්‍රාවණයක් යනු කුමක්ද?

.....

.....

.....

.....

v. ප්‍රාථමික සම්මත සඳහා උදාහරණ 02 ක් දෙන්න.

.....

.....

.....

vi. NaOH හි නිවැරදි සාන්ද්‍රණයෙන් යුත් සම්මත ද්‍රාවණයක් පිළියෙල කර ගත නොහැක්කේ මන්ද?

.....

.....

vii. ඉහත සාදන ලද $1 \text{ mol dm}^{-3} \text{Na}_2\text{CO}_3$ ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය කුඩා ප්‍රමාණයකින් වෙනස් විය හැක. එයට හේතු 2 ක් දෙන්න.

.....

.....

.....

viii. දන්නා සාන්ද්‍රණයෙන් යුත් ද්‍රාවණයක් පිළියෙල කිරීමට භාවිතා කරන වීදුරු උපකරණය කුමක්ද?

.....

ix. ඉහත $1 \text{ mol dm}^{-3} \text{Na}_2\text{CO}_3$ ද්‍රාවණය භාවිතා කර $0.25 \text{ mol dm}^{-3} \text{Na}_2\text{CO}_3$ 100 cm^3 ක් සාදා ගැනීම සඳහා එම ද්‍රාවණයෙන් ලබා ගත යුතු පරිමාව ගණනය කරන්න.



(04) කිසියම් සංයෝගයක ස්කන්ධය අනුව 30.46% ක් නයිට්‍රජන් ද, 69.54% ඔක්සිජන් ද වේ. සංයෝගයේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය 90 - 95 අතර වේ.

i. සංයෝගයේ ආනුභවික සූත්‍රය සොයන්න. ($N = 14, O = 16$)

ii. සංයෝගයේ අණුක සූත්‍රය සොයන්න.

iii. සංයෝගයේ නිවැරදි මවුලික ස්කන්ධය කොපමණද?

(b) I. KMnO_4 වර්ණවත් සංයෝගයකි.

i. KMnO_4 හි IUPAC නාමය ලියන්න,

.....
.....

ii. KMnO_4 තුළ Mn හි ඔක්සිකරණ අංකයෙන් ව්‍යුත්පන්න වන ඔක්සයිඩයේ රසායනික සූත්‍රය ලියන්න.

.....
.....
.....
.....





iii. Mn හි ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය $1s^2 2s^2 \dots$ යන සාමාන්‍ය ආකාරයට ලියන්න.

.....

.....

iv. ආම්ලික මාධ්‍යයේ දී $K_2Cr_2O_7$ අයන $K_2C_2O_4$ සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි.



1. ඔක්සිකරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න.

.....

.....

.....

2. ඔක්සිහරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න.

.....

.....

.....

3. තුලිත අයනික සමීකරණය ලියන්න.

.....

.....

.....

4. ආම්ලික මාධ්‍ය ලෙස තනුක H_2SO_4 භාවිතා කළේ නම්, තුලිත රසායනික සමීකරණය ලියන්න.

.....

.....

.....

(c) 298 K දී $2NH_3(g) \rightarrow N_2(g) + 3H_2(g)$ යන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා සම්මත මවුලික එන්තැල්පි විපර්යාසය 90 kJ mol^{-1} වේ. 298 K දී සම්මත එන්ට්‍රොපි විපර්යාසය $250\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$ වේ.

i. ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා ΔG^θ ගණනය කරන්න.

.....

.....

.....



ii. 298 K දී ප්‍රතික්‍රියාවේ ස්වයංසිද්ධතාව පැහැදිලි කරන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

iii. මෙම ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයංසිද්ධව සිදුවීම සඳහා අවශ්‍ය කරන අවම උෂ්ණත්වය ගණනය කරන්න.

.....


.....

.....

.....



- (05) (a) පරිමාව 8.314 dm^3 වන සංචාන දෘඩ බදුනක $2.4 \times 10^5 \text{ Pa}$ පීඩනයක් යටතේ Cl_2 වායුව ද පරිමාව 4.157 dm^3 වන සංචාන දෘඩ භාජනයක $1.6 \times 10^5 \text{ Pa}$ පීඩනයක් යටතේ NH_3 වායුව ද අන්තර්ගතව පවතී, මෙම භාජන දෙකම 127°C උෂ්ණත්වයේ පවතින අතර ඒවා සිහින් වීදුරු නලයක් මගින් රූප සටහනේ පරිදි එකිනෙක සම්බන්ධ කර ඇත.



- කරාමය විවෘත කිරීමට පෙර එක් එක් භාජනයේ අඩංගු වායු මවුල සංඛ්‍යා වෙන වෙනම ගණනය කරන්න.
 - ඉහත භාජන දෙක සම්බන්ධිත කරාමය විවෘත කර වායු මිශ්‍ර වීමට ඉඩ හරින ලදී, එහිදී NH_3 හා Cl_2 පහත සමීකරණයට අනුව එකිනෙක සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන ලදී.

$$\text{NH}_3(g) + 3\text{Cl}_2(g) \rightarrow \text{NCl}_3(g) + 3\text{HCl}(g)$$
 - ප්‍රතික්‍රියාව සම්පූර්ණ වීමෙන් පසු බඳුන් තුළ වූ මුළු මවුල සංඛ්‍යාව ගණනය කරන්න.
 - ප්‍රතික්‍රියාව සම්පූර්ණ වීමෙන් පසු පද්ධතිය තුළ මුළු පීඩනය ගණනය කරන්න.
 - ඇතුළත වායු පිටතට නොයන පරිදි පද්ධතිය තුළට තවත් $\text{NH}_3(g)$ 0.4 mol ක් එක් කළ විට පද්ධතිය තුළ පීඩනයට කුමක්වේදැයි හේතු දක්වමින් පහදන්න.
 - පද්ධතිය තුළ අවසාන පීඩනය ගණනය කරන්න.
- (b) විද්‍යාගාරයේ දී H_2 වල මවුලික පරිමාව යොදා ගනිමින් Mg වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය පරීක්ෂණාත්මකව නිර්ණය කිරීම සඳහා ශීර්ෂයක විසින් පරීක්ෂණයක් සැලසුම් කරන ලදී.
- Mg හා ත. HCl යොදාගෙන සිදු කළ මෙම පරීක්ෂණය සඳහා භාවිතා කළ හැකි පරීක්ෂණාත්මක ඇටවුමක දළ රූප සටහනක් ඇඳ නම් කරන්න.
 - ශිෂ්‍යයා විසින් සිදු කරන ලද පරීක්ෂණයේ දී ලැබූ ප්‍රතිඵල පහත දැක්වේ.

කාමර උෂ්ණත්වය	$= 27^\circ\text{C}$
වායුගෝල පීඩනය	$= 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$
ජලයේ වාෂ්ප පීඩනය	$= 0.036 \times 10^5 \text{ Pa}$
නිපද වූ H_2 වායු පරිමාව	$= 50 \text{ cm}^3$
Mg වල ස්කන්ධය	$= 0.05 \text{ g}$

 - Mg හා ත. HCl අතර ප්‍රතික්‍රියාවේ තුලිත රසායනික සමීකරණය ලියන්න.
 - ඉහත දත්ත භාවිතයෙන් Mg වල සා.ප.ස්. ගණනය කරන්න.
 - මෙම ගණනයේ දී ඔබ විසින් කරනු ලබන උපකල්පන සඳහන් කරන්න.
- (c)
 - වාලක අණුක වාදයේ උපකල්පන සඳහන් කරන්න.
 - වාලක අණුක වාදයේ සමීකරණය ලියා එහි පද හඳුන්වන්න.

- (06)(a)
 - පහත සඳහන් එන්තැල්පි විපර්යාස වලට අදාළ තුළිත සමීකරණය ලියන්න.
 - $\text{C}(s)$ හි සම්මත දහන එන්තැල්පිය. (ΔH_c^θ)
 - $\text{Na}(s)$ හි සම්මත උෞර්ධවපාතන එන්තැල්පිය. (ΔH_f^θ)
 - $\text{O}_2(g)$ හි සම්මත බන්ධන විඝටන එන්තැල්පිය. (ΔH_b^θ)
 - ක්ලෝරීන් හි සම්මත පරමාණුකරන එන්තැල්පිය ($\Delta H_{\text{atm}}^\theta$)
 - $\text{MgCl}_2(s)$ හි සම්මත දැලිස් විඝටන එන්තැල්පිය. (ΔH_L^θ)

- (b) පහත සඳහන් දත්ත භාවිතා කර, 25°C දී $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ යන ප්‍රතික්‍රියාවේ,
- සම්මත එන්තැල්පි විපර්යාසය ගණනය කරන්න.
 - සම්මත එන්ට්‍රොපි විපර්යාසය ගණනය කරන්න.
 - ඉහත ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයංසිද්ධව සිදුවේද? නොවේද? යන්න පුරෝකථනය කරන්න.

$$\begin{aligned} \text{H} - \text{H} \text{ හි සම්මත බන්ධන විඝටන එන්තැල්පිය} &= +432 \text{ kJmol}^{-1} \\ \text{O} = \text{O} \text{ හි සම්මත බන්ධන විඝටන එන්තැල්පිය} &= +494 \text{ kJmol}^{-1} \\ \text{O} - \text{H} \text{ හි සම්මත බන්ධන විඝටන එන්තැල්පිය} &= +460 \text{ kJmol}^{-1} \end{aligned}$$

සංයෝගය	$s^{\theta} / \text{J K}^{-1}\text{mol}^{-1}$
$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	+ 188.8
$\text{H}_2(\text{g})$	+ 130.7
$\text{O}_2(\text{g})$	+ 205.1

- (c) පහත දැක්වෙන තාපරසායනික දත්ත භාවිතා කර $\text{MgCl}_2(\text{s})$ හි සම්මත දැලිස් විඝටන එන්තැල්පිය, සුදුසු බෝන් - හේබර් චක්‍රයක් ආධාරයෙන් ගණනය කරන්න.


$$\begin{aligned} \text{Mg}(\text{s}) \text{ හි සම්මත උෆ්ට්ට්පාතන එන්තැල්පිය} &= +148 \text{ kJmol}^{-1} \\ \text{Mg}(\text{g}) \text{ හි සම්මත ප්‍රථම අයනීකරණ එන්තැල්පිය} &= +738 \text{ kJmol}^{-1} \\ \text{Mg}(\text{g}) \text{ හි සම්මත දෙවන අයනීකරණ එන්තැල්පිය} &= +1451 \text{ kJmol}^{-1} \\ \text{Cl}_2(\text{g}) \text{ හි සම්මත බන්ධන විඝටන එන්තැල්පිය} &= +244 \text{ kJmol}^{-1} \\ \text{MgCl}_2(\text{s}) \text{ හි සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය} &= -641 \text{ kJmol}^{-1} \\ \text{Cl}(\text{g}) \text{ හි සම්මත පළමු ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමේ එන්තැල්පිය} &= -349 \text{ kJmol}^{-1} \end{aligned}$$

- (07) (a) ශිෂ්‍යයන් පිරිසක් විසින් සිදුකරන ලද එක්තරා පරීක්ෂණයක දී ලබා ගත් තොරතුරු පහත දැක්වේ.

සාන්ද්‍රණය 2 mol dm^{-3} වන තනුක HNO_3 ද්‍රාවණ 125 cm^3 ක් සාන්ද්‍රණය 2 mol dm^{-3} KOH ද්‍රාවණ 125 cm^3 ක් සමඟ ප්ලාස්ටික් කෝප්පයක් තුළ මිශ්‍ර කර පද්ධතිය එළඹෙන උපරිම උෂ්ණත්වය 40°C ක් බව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. සියලුම ද්‍රාවණ මිශ්‍ර කිරීමට පෙර ආරම්භක උෂ්ණත්වය 27°C හි පැවතුණි නම්, (ජලයේ විශිෂ්ඨ තාප ධාරිතාව $= 4.2 \text{ J g}^{-1}\text{K}^{-1}$ ජලයේ ඝනත්වය $= 1 \text{ gcm}^{-3}$)



- තනුක HNO_3 හා KOH අතර තුලිත රසායනික සමීකරණය ලියන්න.
- තනුක HNO_3 හා KOH අතර ප්‍රතික්‍රියාවේ තාප විපර්යාසය (Q) ගණනය කරන්න.
- තනුක HNO_3 හා KOH අතර ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා සම්මත උදාසීනීකරණ එන්තැල්පිය ගණනය කරන්න.
- ඉහත පරීක්ෂණයේ දී සිදුකරන උපකල්පන 2ක් ලියන්න.
- සම්මත උදාසීනීකරණ එන්තැල්පි අගය, ඉහත ශිෂ්‍යයන් විසින් සිදු කරන ලද පරීක්ෂණය ආධාරයෙන් සිදු කිරීමේ දී සම්මත අගයෙන් වෙනස් වීමට හේතු කවරේද?
- $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq})$ හා $\text{NaOH}(\text{aq})$ අතර ප්‍රතික්‍රියාවෙන් $\text{Ba}(\text{OH})_2(\text{aq})$ සහ $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq})$ අතර ප්‍රතික්‍රියාවේදීත් සම්මත එන්තැල්පි අගයයන්, සම්මත උදාසීනීකරණ එන්තැල්පි අගයෙන් කෙසේ වෙනස් වේද?

- (b) $\text{KNO}_3(\text{s})$ 1.55 g ක් අසම්පූර්ණ තාප විශෝජනයෙන් පසු ඉතිරි වූ ඝණ ශේෂය ජලයේ දියකර මුළු පරිමාව 250 cm^3 ක් වූ ද්‍රාවණයක් සාදා ගන්නා ලදී. මෙයින් 25 cm^3 ක් 0.015 moldm^{-3} ආම්ලික KMnO_4 ද්‍රාවණයක් සමඟ අනුමාපනය කරන ලදී. එහිදී වැය වූ KMnO_4 පරිමාව 30 cm^3 කි.



- අදාළ සියලු ප්‍රතික්‍රියා සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණ ලියන්න.
- තාප විශෝජනයෙන් පසු ඉතිරිව පවතින KNO_3 ස්කන්ධය ගණනය කරන්න. ($K = 39, \text{Mn} = 55, \text{O} = 16, \text{N} = 14$)






- (C) (i) ආම්ලික මාධ්‍යයේ දී $Cr_2O_7^{2-}$ අයනය Cr^{3+} බවට ඔක්සිහරණයට අදාළ තුලිත අර්ධ අයනික ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න.
- (ii) භාස්මික මාධ්‍යයේ දී MnO_4^- අයනය MnO_2 බවට ඔක්සිහරණයට අදාළ තුලිත අර්ධ අයනික ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න.
- (iii) I_2 සහ $Na_2S_2O_3$ අතර තුලිත රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න.



C - කොටස

- මෙම කොටසින් ප්‍රශ්න දෙකකට පිළිතුරු සපයන්න.

(08) (a) පහත දී ඇති සංයෝග වල විශෝජනයට අදාළ තුලිත රසායනික සමීකරණ ලියන්න.



(b) Q නැමැති ලවණය සමඟ සිදු කරන ලද පරීක්ෂණ සහ ඊට අදාළ නිරීක්ෂණ පහත දක්වා ඇත.

පරීක්ෂාව	නිරීක්ෂණය
(i) Q හි ජලීය ද්‍රාවණයකට Na_2SO_4 ද්‍රාවණයක් එක්කරන ලදී.	සුදු පැහැ අවක්ෂේපයක් ලැබෙන අතර, එම අවක්ෂේපය තනුක HNO_3 තුල දිය නොවේ.
(ii) Q ලවණය රත්කරන ලදී.	දුඹුරු පැහැ වායුවක් පිට විය.
(iii) Q ලවණය පහන්පිළි පරීක්ෂාවට භාජනය කරන ලදී.	කහ කොළ පැහැති දැල්ලක් ලැබේ.

(i) ඉහත එක් එක් පරීක්ෂාවෙන් ලද නිගමන සඳහන් කරන්න.

(ii) Q ලවණය හඳුනාගන්න.

(iii) ඉහත (i) සහ (ii) පරීක්ෂාවන්ට අදාළව තුලිත රසායනික සමීකරණ ලියන්න.

(c) (i) KNO_3 හා $Ca(NO_3)_2$ පමණක් අඩංගු මිශ්‍රණයකින් $2.84 g$ ක් සම්පූර්ණ තාප විශෝජනයෙන් ලැබුණු ඝන ශේෂයේ ස්කන්ධය $1.98 g$ ක් විය. මිශ්‍රණයේ තිබූ KNO_3 හා $Ca(NO_3)_2$ වල ස්කන්ධ ප්‍රතිශත ගණනය කරන්න.

$$(Ca = 40, K = 39, N = 14, O = 16)$$

(ii) මෙම මිශ්‍රණය රත් කිරීමේ දී ඔබ දකින නිරීක්ෂණයක් සඳහන් කරන්න.

(09) (a) පහත දී ඇති ගුණයන් ආරෝහණය වන පිළිවෙලට සකසා, එසේ වීමට හේතුව පහදන්න.

i. $Be(NO_3)_2$, $Mg(NO_3)_2$, $Ca(NO_3)_2$ වල තාප ස්ථායීතාව.

ii. $NaOH$, KOH , $Mg(OH)_2$ වල භාස්මිකතාව

iii. PF_3 , PCl_3 , PI_3 වල දී P වල විද්‍යුත් ඍණතාව

iv. H_2O , H_2S , H_2Se වල තාපාංකය



i. $\left. \begin{array}{l} Na_2CO_3 (aq) \\ Na_2SO_4 (aq) \\ BaCl_2 (aq) \\ NaNO_3 (aq) \end{array} \right\}$ ද්‍රාවණ යුගල වශයෙන් මිශ්‍ර කිරීම සහ අවශ්‍ය නම් තනුක HNO_3 භාවිතය.

ii. $\left. \begin{array}{l} Na_2CrO_4 (aq) \\ MgCl_2 (aq) \\ Ba(NO_3)_2 (aq) \\ Na_2CO_3 (aq) \end{array} \right\}$ ද්‍රාවණ යුගල වශයෙන් මිශ්‍ර කිරීමෙන්

iii. $\left. \begin{array}{l} Mg(NO_3)_2 (aq) \\ NaNO_3 (aq) \\ Na_2CO_3 (aq) \end{array} \right\}$ රක් කිරීම මගින් (රක් කිරීමට අදාළ සමීකරණ ලියා දැක්විය යුතුය.)

(i) $NaHCO_3$ (ii) $CuSO_4$ (iii) $CuCl_2$
(iv) $Fe_2(SO_4)_3$ (v) $KMnO_4$

(i) XeF_4

(ii) PF_5

(iii) NCl_3



(iv) ClO_4^-

(v) NO_3^-

i. X හි ආනුභාවික සූත්‍රය අපෝහනය කරන්න. ($Cr = 52, N = 14, O = 16, H = 1$)

ii. X මවුලයක Cr මවුල 2 ක් අන්තර්ගතව පවතින අතර එහි H_2O අණු අන්තර්ගත වී නොමැතිනම්, X හි අණුක සූත්‍රය සොයන්න.

(c) සංශුද්ධ නොවන $KMnO_4$ සාම්පලයකින් $200mg$ ක් ජලය 100 cm^3 ක දිය කර ද්‍රාවණයක් පිළියෙල කර ගන්නා ලදී. එම ද්‍රාවණයෙන් 25 cm^3 ක් අනුමාපනයට 0.02 mol dm^{-3} ආම්ලික ඔක්සලේට් $[C_2O_4^{2-}]$ ද්‍රාවණයකින් 15 cm^3 ක් වැය විය. $KMnO_4$ සාම්පලයේ $KMnO_4$ ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය ගණනය කරන්න. ($K = 39, Mn = 55, O = 16, C = 12$)



புரீகிதா வடிவ
ஆவர்த்தன அட்டவணை
Periodic Table

	1																	2		
1	H																	He		
2	3	4													5	6	7	8	9	10
	Li	Be													B	C	N	O	F	Ne
3	11	12													13	14	15	16	17	18
	Na	Mg													Al	Si	P	S	Cl	Ar
4	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr		
5	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		
	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe		
6	55	56	La	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86		
	Cs	Ba	Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn		
7	87	88	Ac	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113							
	Fr	Ra	Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Uun	Uuu	Uub	Uut							
	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71					
	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu					
	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103					
	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr					



වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
දෙවන වාර පරීක්ෂණය - 2020 - 12 ශ්‍රේණිය
රසායන විද්‍යාව I

(1) - 4	(11) - 3	(21) - 2	(31) - 2	(41) - 1
(2) - 1	(12) - 4	(22) - 4	(32) - 4	(42) - 4
(3) - 2	(13) - 1	(23) - 2	(33) - 3	(43) - 5
(4) - 5	(14) - 3	(24) - 4	(34) - 5	(44) - 5
(5) - 3	(15) - 1	(25) - 5	(35) - 5	(45) - 2
(6) - 1	(16) - 5	(26) - 3	(36) - 1	(46) - 4
(7) - 4	(17) - 3	(27) - 1	(37) - 4	(47) - 1
(8) - 2	(18) - 4	(28) - 2	(38) - 2	(48) - 3
(9) - 5	(19) - 5	(29) - 3	(39) - 1	(49) - 2
(10) - 3	(20) - 4	(30) - 1	(40) - 2	(50) - 3



රසායන විද්‍යාව II

A කොටස ව්‍යුහගත කොටස

(01) a. I. පහත සඳහන් ප්‍රශ්න ආවර්තිතා වගුවේ තුන්වන ආවර්ගයේ මූලද්‍රව්‍ය හා සම්බන්ධ වේ. කොටස් (i) සිට (v) දක්වා පිළිතුරු ලබා දීමේ දී ලබා දී ඇති අවකාශයේ මූලද්‍රව්‍යයේ සංකේතය ලියන්න.

i. අඩුම විද්‍යුත් සෘණතාව ඇති මූලද්‍රව්‍ය හඳුනාගන්න. (උචිත වායුව නොසලකා හරින්න.)

..... Na

ii. ප්‍රමාණයෙන් කුඩාම ඒක පරමාණුක අයනය සාදන මූලද්‍රව්‍ය හඳුනාගන්න. (මෙම අයනය ස්ථායී විය යුතුය.)

..... Al

iii. *p* ඉලෙක්ට්‍රෝන නොමැති නමුත් ස්ථායී චිත්‍යාසයක් ඇති මූලද්‍රව්‍ය හඳුනාගන්න.

..... Mg

iv. දෙවැනියට වැඩිම පළමු අයනීකරණ ශක්තිය ඇති මූලද්‍රව්‍ය හඳුනාගන්න.

..... Cl


v. වායුමය අවස්ථාවේ දී ද්වි අවයවික වශයෙන් පවතින ඉලෙක්ට්‍රෝන උෘත සංයෝග සාදන මූලද්‍රව්‍ය හඳුනා ගන්න.

..... Al



$$2 \times 0.4 \times 5 = 20$$

(b) $CH_2NO_2^-$ අයනය සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ලිවිස් තිත් - ඉරි ව්‍යුහය අඳින්න.

I. එහි සැකිල්ල පහත දක්වා ඇත.




II. H_3CN_2O අණුව සඳහා වඩාත්ම ස්ථායී ලිවිස් තිත් - ඉරි ව්‍යුහය පහත දක්වා ඇත. මෙම අණුව සඳහා තවත් ලිවිස් තිත් - ඉරි ව්‍යුහ (සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ) දෙකක් අඳින්න. ඔබ විසින් අඳින ලද වඩාත් අස්ථායී ව්‍යුහය යටින් 'අස්ථායී' ලෙස ලියන්න.




ඉස්මාර්ත . (02)

III. පහත සඳහන් ලුච්ස් තීන් - ඉරි ව්‍යුහය පදනම් කරගෙන වගුවේ ඇති C, N හා O පරමාණුවල,

- පරමාණුව වටා VSEPR යුගල්
- පරමාණුව වට ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය
- පරමාණුව වටා හැඩය
- පරමාණුවේ මුහුම්කරණය සඳහන් කරන්න.
- පරමාණුවේ ඔක්සිකරණ අංකය සඳහන් කරන්න.



පහත දැක්වෙන පරිදි පරමාණු අංකනය කර ඇත.



	O ¹	C ²	C ³	N ⁵
VSEPR යුගල්	4	2	2	4
ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය	තෙත්‍රාහිත	රේඛීය	රේඛීය	තෙත්‍රාහිත
හැඩය	තෙත්‍රාහිත	රේඛීය	රේඛීය	ත්‍රිකෝණීය
මුහුම්කරණය	sp ³	sp	sp	sp ³
ඔක්සිකරණ අංකය	-2	+1	0	+1


(එ 01 x 20 = 20)

IV. ඉහත (III) කොටසෙහි ලුච්ස් තීන් - ඉරි ව්‍යුහයෙහි පහත සඳහන් σ බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක / මුහුම් කාක්ෂික හඳුනාගන්න. (පරමාණුවල අංකනය (III) කොටසෙහි ආකාරයටම වේ.)

- | | | | |
|------|---------------------------------|--|---|
| i. | H - O ¹ | H ... 1s ... වංකා ... | O ¹ ... sp ³ ... මු.කා ... |
| ii. | O ¹ - C ² | O ¹ ... sp ³ ... මු.කා ... | C ² ... sp ... මු.කා ... |
| iii. | C ² - C ³ | C ² ... sp ... මු.කා ... | C ³ ... sp ... මු.කා ... |
| iv. | C ³ - C ⁴ | C ³ ... sp ... මු.කා ... | C ⁴ ... sp ² ... මු.කා ... |
| v. | C ⁴ - N ⁵ | C ⁴ ... sp ² ... මු.කා ... | N ⁵ ... sp ³ ... මු.කා ... |
| vi. | C ⁴ - O | C ⁴ ... sp ² ... මු.කා ... | O ... 2p ... වංකා ... හෝ
sp ² මු.කා . |

(එ 01 x 12 = 12)

V. ඉහත (III) කොටසෙහි දෙන ලද ලුච්ස් තීන් - ඉරි ව්‍යුහයෙහි පහත සඳහන් π බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක කාක්ෂික හඳුනාගන්න. (පරමාණුවල අංකනය (III) කොටසෙහි ආකාරයටම වේ.)



(ල : 01 x 4 = 4)

VI. i. ඉහත (III) කොටසෙහි දෙන ලද ලුච්ස් තීන් - ඉරි ව්‍යුහයෙහි ත්‍රිත්ව බන්ධනයේ π බන්ධන දෙක දිශානත වී ඇත්තේ කෙසේද?

..... (ල : 02)


ii. එකිනෙකට වෙනස් පරමාණු 2 ක් අතර ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් සහිත අණුවක් / අයනයක් සඳහා උදාහරණයක් දෙන්න.

..... (ල : 02)

සැ.යු. ඔබේ උදාහරණයෙහි පරමාණු 3 කට වඩා අඩංගු නොවිය යුතුයි.

ඔබ දෙන උදාහරණයේ ඇති මූලද්‍රව්‍ය ආවර්තිතා වගුවේ පළමුවන හා දෙවන ආවර්තවලට සීමා විය යුතුය.

(c) i. පරමාණුක කාක්ෂිකයක් විස්තර කරනුයේ n, l සහ m_l ක්වොන්ටම් අංක තුන මගිනි. අදාළ ක්වොන්ටම් අංක සහ පරමාණුක කාක්ෂිකයේ නම පහත දැක්වෙන කොටුවල ලියන්න.



(ල : 01 x 6 = 6)

ii. වරහන් තුළ දක්වා ඇති ගුණය වැඩිවන පිළිවෙලට පහත සඳහන් දෑ සකසන්න. (හේතු අවශ්‍ය නොවේ.)

I. $BeCO_3$, $MgCO_3$, $CaCO_3$ (වියෝජන උෂ්ණත්වය)

.....

II. N^+O_2 , NO_2 , NO_2^- ($ON\bar{O}$ බන්ධන කෝණය)

.....

III. C_2H_6 , C_2H_4 , C_2H_2 ($C - C$ බන්ධන දිග)

..... (ල : 06 x 3 = 18)

(02) a. X යනු ආවර්තිතා වගුවේ s - ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍යයකි. X හි පළමු දෙවැනි හා තුන්වැනි අයනීකරණ ශක්තීන් පිළිවෙලින් kJ mol^{-1} වලින්, 519, 7300, 11800. $\text{H}_2(\text{g})$ මුදා හරිමින් හා එහි හයිඩ්‍රොක්සයිඩය සාදමින් X ජලය සමඟ ප්‍රබල නොවන ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදු කරයි. හයිඩ්‍රොක්සයිඩය භාස්මික වේ. X තනුක අම්ල සමඟ ප්‍රතික්‍රියාවේ දී $\text{H}_2(\text{g})$ මුදා හැරේ. X වාතයේ දහනය වී සහ සංයෝග දෙකක මිශ්‍රණයක් ලබා දේ. එම සංයෝග දෙක ජලයට එක් කළ විට Y නැමැති භාස්මික වායුවක් පිටවේ.

i. X හඳුනාගන්න.

..... Li (ඉ: 07)

ii. X හි භූමි අවස්ථාවේ ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය ලියන්න.

..... $1s^2 2s^1$ (ඉ: 04)

iii. X වාතයේ දහනයේ දී සෑදෙන සංයෝග දෙකෙහි රසායනික සූත්‍ර ලියන්න.

..... Li_2O (ඉ: 03) හා Li_3N (ඉ: 03)

iv. s ගොනුවේ X අයත්වන කාණ්ඩය හැරුණු විට අනෙක් කාණ්ඩයෙහි මූලද්‍රව්‍යයන්හි දී ඇති සංයෝග සලකන්න. කාණ්ඩයේ පහළට යාමේ දී දක්වා ඇති ගුණය වැඩිවේ ද අඩුවේ ද යන්න දී ඇති කොටු තුළ සඳහන් කරන්න.

1. සල්ෆයිටවල ජලයේ ද්‍රාව්‍යතාවය

අඩුවේ (ඉ: 03)

2. හයිඩ්‍රොක්සයිඩවල ජලයේ ද්‍රාව්‍යතාවය

වැඩේ (ඉ: 03)

3. ලෝහ නයිට්‍රේටවල තාප ස්ථායීතාවය

වැඩේ (ඉ: 03)

3 හි ඔබගේ පිළිතුරට හේතුව දක්වන්න.

..... කාබොක්සිලික් අම්ල කාණ්ඩයට පැවත යාමයි. (ඉ: 03)
 භූමිකම්බිය බලය අඩුවේ. (ඉ: 02)
 දාමය සමඟ දැමූ ලෝහ අයුරු නැවත ජලයට වැටී යයි. (ඉ: 03) } 08

v. $\text{H}_2(\text{g}), \text{O}_2(\text{g})$ හා $\text{N}_2(\text{g})$ සමඟ X ට බොහෝ දුරට සමාන ලෙස ප්‍රතික්‍රියා කරන නමුත් X අඩංගු කාණ්ඩයට අයත් නොවන ආවර්තිතා වගුවේ s - ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය හඳුනාගන්න.

..... Mg (ඉ: 04)

vi. ඉහත Y නමැති භාස්මික වායුව කුමක්ද?

..... NH_3 (ඉ: 04)

vi. Y හඳුනා ගැනීම සඳහා පරීක්ෂණයක් දෙන්න.

..... රතුරු ගතවන රතු වර්ණයක් හරහා යවීම මගින් සාදා නිකුත් වේ.

viii එම පරීක්ෂණයේ නිරීක්ෂණය කුමක්ද? (ඉ: 04)

..... රතු වර්ණය නිවැරදි වේ. (ඉ: 04)

..... සහ අයුරු නිකුත් වී නිරීක්ෂණය වේ.

ඉහත (i) සිට (vi) දක්වා ලබා ලබා දීමට (i) නිකුත් විය යුතුය.
 ඉහත (vii) සිට (viii) දක්වා 5 ලබා ලබා දීමට (vi) නිකුත් විය යුතුය.


- (b) A සිට E දක්වා නම් කර ඇති පරීක්ෂණ තල වල $\text{Na}_2\text{SO}_4, \text{Na}_2\text{SO}_3, \text{NaOH}, \text{K}_2\text{CrO}_4$ හා $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ හි (පිළිවෙලින් නොවේ) ජලීය ද්‍රාවණ අඩංගු වේ. A සිට E දක්වා ඇති එක් එක් පරීක්ෂණ තලයට අදාළ පරීක්ෂණය හා අදාළ නිරීක්ෂණ පහත දී ඇත.

පරීක්ෂණ තලය	පරීක්ෂණය	නිරීක්ෂණය
A	BaCl_2 ද්‍රාවණ ද්‍රාවණ 1 cm^3 එකතු කරන්න. ඉන්පසු තනුක HCl එකතු කරන්න.	සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක් ලැබේ පසුව එය දියවේ.
B	$\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ ද්‍රාවණය එකතු කරන්න.	සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක් ලැබේ.
C	BaCl_2 ද්‍රාවණ 1 cm^3 පමණ එකතු කරන්න. ඉන්පසු ත. HCl එකතු කරන්න.	සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක් සෑදේ. එය දිය නොවේ.
D	Na_2CO_3 1 cm^3 ක් පමණ එකතු කරන්න.	සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක් ලැබේ.
E	BaCl_2 ද්‍රාවණ 1 cm^3 එකතු කරන්න.	කහ පැහැති අවක්ෂේපයක් ලැබේ.

- (i) A සිට E දක්වා පරීක්ෂණ තල වල ද්‍රාවණ හඳුනාගන්න.

A Na_2SO_3 B NaOH
 C Na_2SO_4 D $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$
 E K_2CrO_4 (එ : 05 x 5 = 25)

- (ii) A, B, C, D හා E පරීක්ෂණ තල වල සිදුවන ප්‍රතික්‍රියා සඳහා තුලිත රසායනික / අයනික සමීකරණය ලියන්න.



- (03) (a) I. විද්‍යාගාරයේ දී 1 mol dm^{-3} Na_2CO_3 ද්‍රාවණ 250 cm^3 සෑදීම සඳහා ඝන $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ සපයා ඇත. (Na = 23, C = 12, O = 16, H = 1)

- i. අවශ්‍ය කරන Na_2CO_3 mol ගණන කොපමණද?

$$n = C \cdot V$$

$$= 1 \text{ mol dm}^{-3} \times 250 \times 10^{-3} \text{ dm}^3$$

$$= 0.25 \text{ mol} \quad (\text{එ : 05 x 2 = 10})$$

- ii. කිරාගත යුතු $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ස්කන්ධය කොපමණද?

$$M_r(\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) = (23 \times 2) + 12 + (16 \times 3) + (5 \times 18) = 196$$

$$m = n \cdot M_r = 0.25 \text{ mol} \times 196 \text{ g mol}^{-1}$$

$$m = 49 \text{ g}$$

(7 x 2 = 14 අංකය ආබාධය 1) = (එ : 15)

iii. ප්‍රාමාණික ද්‍රාවණයක් යනු කුමක්ද?

ආර්. 0.1 දශනා ආස්‍රායකයක් යුක්ත ද්‍රාවණ. (ඔ. 05)

iv. ප්‍රාථමික සම්මත ද්‍රාවණයක් යනු කුමක්ද?

ආර්. 0.1 දශනා විදිලි-2 කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය සංරක්ෂණ, ක්ෂුද්‍ර, සංරක්ෂණ ගොඩ, ඉහළ අස්‍රායකයක් සහ ඉහළ ජල ප්‍රාස්‍රායකයක් අතින් යුක්ත ද්‍රාවණයක් සංරක්ෂණය. (ඔ. 15)

v. ප්‍රාථමික සම්මත සඳහා උදාහරණ 02 ක් දෙන්න.

Na_2CO_3 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, KSCN

ඉහළ 2.00 (ඔ. 05 x 2 = 10)

vi. NaOH හි නිවැරදි සාන්ද්‍රණයෙන් යුත් සම්මත ද්‍රාවණයක් පිළියෙල කර ගත නොහැක්කේ මන්ද?

CO_2 දියවීමේදී ආස්‍රායකය ගොඩ විය හැකි නිසා. (ඔ. 10)

vii. ඉහත සාදන ලද $1 \text{ mol dm}^{-3} \text{Na}_2\text{CO}_3$ ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය කුඩා ප්‍රමාණයකින් වෙනස් විය හැක. එයට හේතු 2 ක් දෙන්න.

• $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ සංරක්ෂණ ගොඩ වීම.

• බඳි ඇති ජල අණු ප්‍රාග්ධනය වීම. (ඔ. 05 x 2 = 10)

viii. දන්නා සාන්ද්‍රණයෙන් යුත් ද්‍රාවණයක් පිළියෙල කිරීමට භාවිතා කරන විදුරු උපකරණය කුමක්ද?

පරිමාණික ද්‍රාවණය. (ඔ. 10)

ix. ඉහත $1 \text{ mol dm}^{-3} \text{Na}_2\text{CO}_3$ ද්‍රාවණය භාවිතා කර $0.25 \text{ mol dm}^{-3} \text{Na}_2\text{CO}_3$ 100 cm^3 ක් සාදා ගැනීම සඳහා එම ද්‍රාවණයෙන් ලබා ගත යුතු පරිමාව ගණනය කරන්න.

$$C_1 V_1 = C_2 V_2 \quad (\text{ඔ. 05})$$

$$1 \text{ mol dm}^{-3} \times V = 0.25 \text{ mol dm}^{-3} \times 100 \text{ cm}^3 \quad (\text{ඔ. 4+1})$$

$$V = 25 \text{ cm}^3 \quad \text{ඔ. (04+1)}$$

ඔබගේ පිටපත සඳහා අත්සන ද ලකුණු ප්‍රදානය කරමු.

- (04) කිසියම් සංයෝගයක ස්කන්ධය අනුව 30.46% ක් නයිට්‍රජන් ද, 69.54% ඔක්සිජන් ද වේ. සංයෝගයේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය 90 - 95 අතර වේ.

i. සංයෝගයේ ආනුභවික සූත්‍රය සොයන්න. ($N = 14, O = 16$)

	N	O	
	30.46%	69.54%	
ස්කන්ධය	30.46 g	69.54 g	අනුභවික
$n = \frac{m}{M}$	$\frac{30.46 \text{ g}}{14 \text{ g mol}^{-1}}$	$\frac{69.54 \text{ g}}{16 \text{ g mol}^{-1}}$	ප්‍රමාණය = NO_2
	2.17 mol	4.34 mol	
අනුපාතය	1	2	

ii. සංයෝගයේ අණුක සූත්‍රය සොයන්න.

(අනුභවික ප්‍රමාණය $\times n$) = සා. අ. ස් $\checkmark$

$$[14 + (16 \times 2)]n = 90 - 95 \checkmark$$

$$46n = 90 - 95$$

$$n = \frac{90 - 95}{46} = 2 \checkmark$$

$$\therefore \text{අණුක ප්‍රමාණය} = NO_2 \times 2 = N_2O_4 \checkmark$$

iii. සංයෝගයේ නිවැරදි මවුලික ස්කන්ධය කොපමණද? ($N = 14, O = 16$)

$$N_2O_4 = (14 \times 2) + (16 \times 4) \text{ g mol}^{-1} \checkmark$$

$$= 92 \text{ g mol}^{-1} \checkmark$$

$$(\text{ඉ: } 0.2 \times 10 = 20)$$

(b) I. $KMnO_4$ වර්ණවත් සංයෝගයකි.

i. $KMnO_4$ හි IUPAC නාමය ලියන්න.

..... potassium permanganate (ඉ: 05)



ii. $KMnO_4$ තුළ Mn හි ඔක්සිකරණ අංකයෙන් ව්‍යුත්පන්න වන ඔක්සයිඩයේ රසායනික සූත්‍රය ලියන්න.

..... MnO (ඉ: 05)


iii. Mn හි ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය $1s^2 2s^2 \dots$ යන සාමාන්‍ය ආකාරයට ලියන්න.

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^2$ (ඉ. 05)


iv. ආම්ලික මාධ්‍යයේ දී $K_2Cr_2O_7$ අයන $K_2C_2O_4$ සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි.




1. ඔක්සිකරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න.




2. ඔක්සිකරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න.



3. තුලිත අයනික සමීකරණය ලියන්න.



4. ආම්ලික මාධ්‍ය ලෙස තනුක H_2SO_4 භාවිතා කළේ නම්, තුලිත රසායනික සමීකරණය ලියන්න.



(c) 298 K දී $2NH_3(g) \rightarrow N_2(g) + 3H_2(g)$ යන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා සම්මත මවුලික එන්තල්පි විපර්යාසය 90 kJ mol^{-1} වේ. 298 K දී සම්මත එන්ට්‍රොපි විපර්යාසය $250\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$ වේ.

i. ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා ΔG^θ ගණනය කරන්න.

$$\begin{aligned} \Delta G^\theta &= \Delta H^\theta - T\Delta S^\theta \\ &= (90\text{ kJ mol}^{-1} - 298\text{ K} \times 250 \times 10^{-3}\text{ kJ mol}^{-1}\text{ K}^{-1}) \\ &= 15.5\text{ kJ mol}^{-1} \quad (\text{ඉ. 04+1}) \end{aligned} \quad (\text{ඉ. 05})$$

ii. 298 K දී ප්‍රතික්‍රියාවේ ස්වයංසිද්ධතාව පැහැදිලි කරන්න.

$\Delta G^\circ = +$ හෝ $\Delta G^\circ < 0$ යන්න තීරණය කරන්න. (ඔ: 03)

iii. මෙම ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයංසිද්ධව සිදුවීම සඳහා අවශ්‍ය කරන අවම උෂ්ණත්වය ගණනය කරන්න.

මෙම ප්‍රතික්‍රියාව $\Delta G < 0$ හෝ $\Delta G > 0$ (ඔ: 03)

$\Delta H - T \Delta S < 0$ (ඔ: 03)

$\Delta H < T \Delta S$

$\frac{\Delta H}{\Delta S} < T$ (ඔ: 03)

$\frac{90 \text{ kJ mol}^{-1}}{0.25 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}} < T$ (02 + 1)

360 K < T (ඔ: 03)

ဝဿနာ - ပိဋကတ်.

$$n_{H_2O_2} (n_A) = 0.2 \text{ mol} \quad \checkmark$$

(ලකුණු $3 \times 5 = 15$)

0.2 ✓ 0.6 ✓

(உதா. $3 \times 3 = 15$).

$$p = 2.13 \times 10^5 \text{ Pa. } \checkmark$$


(ဇယား ၂၀)

(உரு 10).


(e.g.).

$$p = 3.2 \times 10^3 \text{ N m}^{-2} \quad \checkmark \quad (\text{e.7})$$

(b). (i).



(ලකුණු 20).



(iii). $P_{H_2} = P_T - P_{H_2O}$
 $= 1.013 \times 10^5 \text{ Pa} - 0.036 \times 10^5 \text{ Pa}$
 $= \underline{0.977 \times 10^5 \text{ Pa}}$ ✓

$H_2(g)$ ට $PV = nRT$,

$0.977 \times 10^5 \text{ Pa} \times 50 \times 10^{-6} \text{ m}^3 = n \times 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 300 \text{ K}$ ✓

$n = 0.002 \text{ mol}$. ✓ (0.0019).

Mg : H_2 මවුල අනුපාතය,

1 : 1 බැවින්,

Mg මවුල = 0.002 mol ✓

Mg මවුල = $\frac{\text{Mg ප්‍රමාණය}}{\text{Mg භා.ව.ම.}}$

$0.002 \text{ mol} = \frac{0.05 \text{ g}}{\text{Mg භා.ව.ම.}}$

$\therefore \text{Mg භා.ව.ම.} = 25$ ✓ (ලකුණු 5x5=25)

(iv) H_2 වායුව පරිපූර්ණ ලෙස ලැබුණි. (ල. 5).

ලකුණු 55

(i). (a). പ്രകാരം.

* മൂലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പദങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്തതായി കാണപ്പെടുന്നു.

* വായു മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പരസ്പര ബന്ധം മറ്റ് ഘടനകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കാണപ്പെടുന്നു.

* വായു മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പരസ്പര ബന്ധം മറ്റ് ഘടനകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കാണപ്പെടുന്നു.

* വായു മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പരസ്പര ബന്ധം മറ്റ് ഘടനകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കാണപ്പെടുന്നു.

* വായു മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പരസ്പര ബന്ധം മറ്റ് ഘടനകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കാണപ്പെടുന്നു.

(രണ്ടു 2x5=10).

(ii). $PV = \frac{1}{3} n N \bar{C}^2$ (രണ്ടു 05)

P = മർദ്ദം.

V = വോളിയം.

n = വായു മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പരസ്പര ബന്ധം.







N = മൂല വായു മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പരസ്പര ബന്ധം.

$\bar{C}^2$ = വായു മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പരസ്പര ബന്ധം.

(രണ്ടു 05).

രണ്ടു 20

6. (a).



දහන ප්‍රතික්‍රියා $2 \times 3 = 06$
 තුළින සමන්විත $2 \times 2 = 04$

හෙබ් නියමය යෙදවීම,

$$\Delta H_f^\circ + 4 \times 460 \text{ kJmol}^{-1} = 2 \times 432 \text{ kJmol}^{-1} + 494 \text{ kJmol}^{-1}$$

$$\Delta H_f^\circ + 1840 = 864 + 494$$

$$\Delta H_f^\circ = 1358 - 1840$$

$$\Delta H_f^\circ = -482 \text{ kJmol}^{-1}$$

විකල්ප පිළිතුර.

ලකුණ 5x2 = 10.

$$\begin{aligned}
 \Delta H_f^\circ &= \sum \Delta H_D^\circ (\text{ප්‍රතික්‍රියා}) - \sum \Delta H_D^\circ (\text{ප්‍රතිචක්‍රියා}) \\
 &= 2 \times 432 \text{ kJmol}^{-1} + 494 \text{ kJmol}^{-1} - 4 \times 460 \text{ kJmol}^{-1} \\
 &= 864 + 494 - 1840 \\
 &= -482 \text{ kJmol}^{-1}
 \end{aligned}$$

(ලකුණ 4x5 = 20)

3

(ii) $\Delta S_r^\ominus = S_{\text{products}}^\ominus - S_{\text{reactants}}^\ominus$ ✓

$$= 2 \times 188.8 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} - \{2 \times 130.7 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} + 205.1 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}\}$$

$$= 377.6 - \{261.4 + 205.1\}$$

$$= 377.6 - 466.5$$

$$= \underline{\underline{-88.9 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}}} \quad (\text{ලකුණ } 4 \times 5 = 20)$$

(iii) $\Delta G_r^\ominus = \Delta H_r^\ominus - T \Delta S_r^\ominus$ ✓

$$= -482 \text{ kJ mol}^{-1} - 298 \text{ K} \times (-88.9 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})$$

$$= -482 \text{ kJ mol}^{-1} + 26492.2 \text{ J mol}^{-1}$$


$$= (-482 + 26.49) \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$= \underline{\underline{-455.51 \text{ kJ mol}^{-1}}} \quad (\text{ලකුණ } 2 \times 5 = 10)$$

$\Delta G_r^\ominus < 0$ බැවින්,

ප්‍රතික්‍රියාව ජනප්‍රසාදීය බව සිදුවේ. (ලකුණ 05)

(C).



$$\Delta H_r^\ominus + 2 \times (-349 \text{ kJ mol}^{-1}) + 1451 \text{ kJ mol}^{-1} + 738 \text{ kJ mol}^{-1} + 244 \text{ kJ mol}^{-1} + 148 \text{ kJ mol}^{-1} = -641 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta H_r^\ominus = -2524 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (\text{ලකුණ } 5 \times 2 = 10)$$

$$\Delta H_r^\ominus = \underline{\underline{-2524 \text{ kJ mol}^{-1}}} \quad (\text{ලකුණ } 70)$$

(*) (a)



(ii). $Q = mc\Delta T$ ✓

(ලකුණු 4)

$$= 250 \text{ cm}^3 \times 1 \text{ g cm}^{-3} \times 4.2 \text{ J K}^{-1} \text{ g}^{-1} \times (313 - 300) \text{ K}$$

$$= 13650 \text{ J}$$

$$= \underline{13.65 \text{ KJ}} \checkmark$$

(ලකුණු $2 \times 5 = 10$)

(iii). දැමූ HNO_3 මවුල $= \frac{2 \times 125}{1000}$

$$= 0.25 \text{ mol} \checkmark$$

HNO_3 0.25 mol මගින් විවෘත කාලය $= 13.65 \text{ KJ}$

HNO_3 1 mol ක් මගින් විවෘත කාලය $= \frac{13.65 \text{ KJ}}{0.25 \text{ mol}} \checkmark$

$$= 54.6 \text{ KJ mol}^{-1}$$


$\therefore$ සම්මත ප්‍රතික්ෂේපණයේ එන්තාල්පිය $= \underline{-54.6 \text{ KJ mol}^{-1}} \checkmark$
(ලකුණු $5 \times 3 = 15$)

(iv) 1. ප්‍රතික්ෂේපණයේ මූලාශ්‍රයේ කාලය මුළුමනින්ම ප්‍රාග්ධන විවිධය ලෙස ගත්තා බව (ප්‍රතික්ෂේපණයේ ආර්ථිකය ආරම්භයෙන් පසුව) බව හා ද්‍රාව්‍ය පරිසරයේ කාලය අවසන් කොට ගත්තා බව ✓


2. ද්‍රාව්‍ය ප්‍රාග්ධනයේ ස්කන්ධය, ජලයේ ස්කන්ධයට සමාන ගැටි ද ප්‍රාග්ධනයේ චි.ක.බ. ජලයේ චි.ක.බ.ට සමාන ගැටි ද පැවතීම. ✓

(ලකුණු $5 \times 2 = 10$)

(v). මෙලෙස සම්මත අගයයන් වෙතත් විවිධ පරිසරවලදී අවමය සහ ආරම්භය ප්‍රතික්ෂේපණයේ විවෘත කාලයෙන් කොටසක් ප්‍රතික්ෂේපණයේ ආරම්භයට හා පරිසරයට ප්‍රතික්ෂේපණය වීමයි. (ලකුණු 5)





ප්‍රතික්ෂේපණයේ දියලු පරිසරයේ බවින්, ප්‍රතික්ෂේපණයේ විවෘත කාලයෙන් කොටසක් ප්‍රතික්ෂේපණයේ විවෘත කාලය ලෙස ගත්තා. ජලයේ සම්මත ප්‍රතික්ෂේපණයේ එන්තාල්පිය -57 KJ mol^{-1} ට වඩා අඩු අගයක් ගත්තා. ✓



මෙහි දී $\text{H}_2\text{O (l)}$ දී මවුල 2 ක් සාපේක්ෂව $\text{BaSO}_4 \text{ (s)}$ ද්‍රාව්‍ය පරිසරයේ සම්මත ප්‍රතික්ෂේපණයේ එන්තාල්පිය -114 KJ mol^{-1} ට වඩා වැඩි අගයක් ගත්තා. (ලකුණු $2 \times 8 = 16$)

ලකුණු 65



(ii). වැය වූ KMnO_4 මවුල = $\frac{0.015}{1000} \times 30$ ✓ (ලකුණ 10x2=20)

= $4.5 \times 10^{-4} \text{ mol}$ ✓

∴ ප්‍රචාර 25 ලීටර් NO_2^- මවුල = $\frac{4.5 \times 10^{-4} \text{ mol} \times 5}{2}$ ✓

= $11.25 \times 10^{-4} \text{ mol}$

ප්‍රචාර 250 ලීටර් NO_2^- මවුල = $\frac{11.25 \times 10^{-4} \text{ mol} \times 250}{25}$ ✓

= $11.25 \times 10^{-3} \text{ mol}$ ✓

∴ KNO_2 මවුල = $11.25 \times 10^{-3} \text{ mol}$ ✓

විඛේපනය වූ KNO_3 මවුල = $11.25 \times 10^{-3} \text{ mol}$ ✓


∴ විඛේපනය වූ KNO_3 බර = $11.25 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 101 \text{ g mol}^{-1}$ ✓

= 1.13 g ✓

මුළු වැය වූ KNO_3 බර = 1.55 g - 1.13 g

= 0.42 g ✓


(ලකුණ 3x10=30)



(ලකුණ 10)








(ලකුණ 10)



(ලකුණ 15)

ලකුණ 3.5

8) a)



(രണ്ടു 10x5 = 50)

രണ്ടു 50



(b) (i) (i) Ba^{2+} ന്റെ Sr^{2+} മുതൽ വരി. (രണ്ടു)

(ii) ഉയർന്ന NO_2 ന്റെ മൂലം
 ഉണ്ടായ $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ ന്റെ $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$ ഉൾപ്പെടെ.

(iii) പരസ്പരം ലയിക്കുന്നവ രണ്ടും - രണ്ടു ഉണ്ടാകി
 മുതൽക്കു ലോഹങ്ങൾ Ba^{2+} മൂലം വരി.

(രണ്ടു 5x6 = 30)



(ii) ഉണ്ടായ - $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$. (രണ്ടു 10)



(രണ്ടു 10x2 = 20)

രണ്ടു 60

27.



KNO_3 මවුල = $x \text{ mol}$

$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ මවුල = $y \text{ mol}$

$101x + 164y = 2.84$ — (1) ✓

$85x + 56y = 1.98$ — (2) ✓

(1) $\times 85$ - (2) $\times 101$,

(ලකුණු $4 \times 2 = 8$)

$8284y = 41.42$

$y = 0.005 \text{ mol}$ ✓

$\therefore \text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ ස්කන්ධය = $0.005 \text{ mol} \times 164 \text{ g mol}^{-1}$
 $= \underline{0.82 \text{ g}}$ ✓

$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය = $\frac{0.82 \text{ g}}{2.84 \text{ g}} \times 100\%$ ✓
 $= \underline{28.87\%}$ ✓

$\therefore \text{KNO}_3$ ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය = $100 - 28.87$
 $= \underline{71.13\%}$ ✓

(ලකුණු $3 \times 6 = 18$)

(ii) ප්‍රියුර් ගැහැනි වායුවක් ජව්ව. (ලකුණු 8).

ලකුණු 40

(99)

(a) (i) $Be(NO_3)_2$ $Mg(NO_3)_2$ $Ca(NO_3)_2$

Be^{2+} NO_3^- Mg^{2+} NO_3^- Ca^{2+} NO_3^-

මෙහි ඇනායනය හොද වේ. (NO_3^-) ✓

තාවයන් වල අර්ධ,

$Be^{2+} < Mg^{2+} < Ca^{2+}$ ✓

∴ ඔක්සිකරණ බලය,

$Be^{2+} > Mg^{2+} > Ca^{2+}$ ✓

සහ සංයුජ ලක්ෂණ $BeCO_3 > MgCO_3 > CaCO_3$ ✓
අයභික ලක්ෂණ $BeCO_3 < MgCO_3 < CaCO_3$

∴ තව ප්‍රතික්ෂේපය $BeCO_3 < MgCO_3 < CaCO_3$ ✓

(ii) $NaOH$ KOH $Mg(OH)_2$

(ලකුණු $2 \times 5 = 10$).

මෙහි OH^- ඇනායනය හොද වේ. ✓

∴ තාවයන් වල අර්ධ. $Mg^{2+} < Na^+ < K^+$ ✓

ඔක්සිකරණ බලය $Mg^{2+} > Na^+ > K^+$ ✓

∴ සහ සංයුජ ලක්ෂණ $Mg(OH)_2 > NaOH > KOH$

අයභික ලක්ෂණ $Mg(OH)_2 < NaOH < KOH$ ✓

OH^- බිඳුණු කිසිවේ ඇතිවේ, (ප්‍රතික්ෂේපය).

$Mg(OH)_2 < NaOH < KOH$ ✓

* විද්‍යුත් ධාරිතා අනුපාතය පදනම් කරගත්විද
බවැරදි විච්ඡේද ලබා ගත නැත.

(ලකුණු $2 \times 5 = 10$).

(iii)	PF_3	PCl_3	PI_3
මුහුණුකරණය	sp^3	sp^3	sp^3 ✓
පරමාණුක			
අවස්ථාපය	0	0	0 ✓
ව. අංකය	+3	+3	+3 ✓

∴ P වල විද්‍යුත් ධාරිතාව සංසන්දනයට යොදා
ගත යුත්තේ P වල පරිවෘත්තීය අනුපාතය පරමාණුක විද්‍යුත්
ධාරිතාවය. විද්‍යුත් ධාරිතාව $F > Cl > Br$ ලෙස වෙනස් වේ.

(10)

(iv) H_2O ని పరిచయము చేయుచు వచ్చుచున్నది. $PF_3 > PCl_3 > PI_3$ ✓ (లేద $2 \times 7 = 14$).

H_2O හා H_2O_2 හි ප්‍රමුඛ ජීවීන්ගේ දැඩිමුඛ - දැඩිමුඛ
 ප්‍රාග්ධන වල පවතී. නමුත් H_2O වඩා H_2O_2 හි
 මෘදුක ප්‍රතික්ෂේප වැඩිවීම හේතුවෙන් H_2O_2 හි දැඩිමුඛ -
 දැඩිමුඛ ප්‍රාග්ධන වල H_2O වඩා වැඩිවේ. H_2O හා
 H_2O_2 හි පවතින දැඩිමුඛ - දැඩිමුඛ ප්‍රාග්ධන වලට
 වඩා H_2O හි ප්‍රතික්ෂේප වැඩිවීම හේතුවෙන් වඩා
 වාසනාකරීය ජීවීන්ගේ ප්‍රමුඛ වැඩිවීම වේ.

பெ ௨௯௫ 49

	$\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{aq})$	$\text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq})$	$\text{BaCl}_2(\text{aq})$	$\text{NaNO}_3(\text{s})$
$\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s})$	-	-	$\text{BaCO}_3(\text{s})$ ppt	-
$\text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq})$	-	-	$\text{BaSO}_4(\text{s})$ ppt	-
$\text{BaCl}_2(\text{aq})$	$\text{BaCO}_3(\text{s})$ ppt	$\text{BaSO}_4(\text{s})$ ppt	-	-
$\text{NaNO}_3(\text{aq})$	-	-	-	-

(ප්‍රශ්න 10)

ද්‍රාවණ විභාග පත්‍රිකේ යුගල් වශයෙන් මිශ්‍ර කිරීමේදී
සූත්‍ර දැක්වීම් අනුව ප්‍රතික්‍රියා 2න් ලැබෙන්නේ $\text{BaCl}_2(aq)$
එකතු කිරීමේදී ය. ලැබෙන සූත්‍ර දැක්වීම් අනුව ප්‍රතික්‍රියා
වලට HNO_3 එකතු කිරීමේදී ප්‍රතික්‍රියා වලට
මුළු ගණනය කළ පසු $\text{BaSO}_4(s)$ බවත් ද්‍රාවණය තුළ
 Na_2SO_4 අඩංගු බවත් පැහැදිලි වේ. සූත්‍ර අනුව ප්‍රතික්‍රියා,
 HNO_3 එකතු කිරීමේදී ද්‍රාවණය වේ නම් පසු $\text{BaCO}_3(s)$
බවත් ද්‍රාවණය තුළ $\text{Na}_2\text{SO}_4(aq)$ අඩංගු බවත් පැහැදිලි වේ.
ද්‍රාවණ යුගල් වශයෙන් මිශ්‍ර කිරීමේදී ප්‍රතික්‍රියා
අනුව ප්‍රතික්‍රියා වලට ගණනය කළ $\text{NaNO}_3(aq)$ බවත්.

(ප්‍රශ්න 2x7=14)


(ii).

	$\text{Na}_2\text{CrO}_4(\text{aq})$	$\text{MgCl}_2(\text{aq})$	$\text{Ba}(\text{NO}_3)_2(\text{aq})$	$\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{aq})$
$\text{Na}_2\text{CrO}_4(\text{aq})$	-	-	$\text{BaCrO}_4(\text{s})$ හඳුනා	-
$\text{MgCl}_2(\text{aq})$	-	-	-	$\text{MgCO}_3(\text{s})$ හඳුනා
$\text{Ba}(\text{NO}_3)_2(\text{aq})$	$\text{BaCrO}_4(\text{s})$ හඳුනා	-	-	$\text{BaCO}_3(\text{s})$ හඳුනා
$\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{aq})$	-	$\text{MgCO}_3(\text{s})$ හඳුනා	$\text{BaCO}_3(\text{s})$ හඳුනා	-

(ලකුණු $2.5 \times 4 = 10$).

එහෙයින් එහි ද්‍රාව්‍ය ප්‍රභේද වශයෙන් විශ්ලේෂණය කිරීමේදී
 ආම්ලක පරිසරයේ දියවිය හැකි ලැබෙන ලැබෙන ද්‍රව්‍යයන්
 ද්‍රාව්‍යය $\text{Na}_2\text{CrO}_4(\text{aq})$ වේ. හුදු හුදු දියවිය හැකි ද්‍රව්‍යයන්
 පමණක් ලැබෙන $\text{MgCl}_2(\text{aq})$ වේ. විශ්ලේෂණය කිරීමේදී
 හුදු ද්‍රව්‍යයන් 2ක් ලැබෙන $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ හඳුනා ගත හැකි ද්‍රාව්‍යය
 $\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{aq})$ වන අතර හුදු හුදු දියවිය හැකි ද්‍රාව්‍යය
 ලෙස ද්‍රව්‍යයන් ප්‍රභේදයන් ලැබෙන්නේ $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ වේ
 පමණක් කිරීමේදී ය.

(ලකුණු $2 \times 9 = 18$).



එම නිසාවෙන් නිවැරදි පිටපත් කළ යුතු
 ලැබෙන්නේ $\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{aq})$ වේ. එහිදී එම නිසාවෙන්
 ද්‍රාව්‍යය හුදු දියවිය හැකි ද්‍රව්‍යයන් වන $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$
 වන අතර එම නිසාවෙන් පමණක් ද්‍රව්‍යයන්
 විවිධ වශයෙන් ලැබෙන්නේ $\text{NaNNO}_3(\text{aq})$ වේ.

(ලකුණු $4 \times 6 = 24$).


මුළු ලකුණු 76.

- (i). NaHCO_3 - Sodium hydrogen Carbonate. ✓
 (ii). CuSO_4 - Copper(II) sulfate. ✓
 (iii). CuCl - Copper(I) chloride. ✓
 (iv). $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ - iron(III) sulfate. ✓
 (v). KMnO_4 - potassium permanganate. ✓

(ලකුණු $5 \times 5 = 25$).

(10) (a).

(i) XeF_4



ඛණ වර්ගයේ ඛණ මුළු ඒකමය ගණන = 6. ✓

VSEPR යුගල = 6. ✓


ආකෘති = 4

වර්ගය යුගල = 2. } (ලකුණු $2 \times 3 = 6$)

∴ හැඩය තලීය වර්ගයක් වේ.

(ලකුණු 4).

(ii) PF_5



P වර්ගයේ මුළු ඒකමය ගණන = 5


VSEPR යුගල = 5

ආකෘති = 5

වර්ගය යුගල = 0

∴ හැඩය ත්‍රිකෝණීය ද්විතලීය වේ.

(iii) NCl_3



N වර්ගයේ මුළු ඒකමය ගණන = 4


VSEPR යුගල = 4

ආකෘති = 4

වර්ගය යුගල = 0

∴ හැඩය ත්‍රිකෝණීය වේ.

(iv) ClO_4^-




Cl වර්ගයේ මුළු ඒකමය ගණන = 7

VSEPR යුගල = 4

ආකෘති = 4

වර්ගය යුගල = 0

∴ හැඩය චතුරස්‍රාකාර වේ.



N වර්ගයේ මුළු ඒකමය ගණන = 4

VSEPR යුගල = 3 (ලකුණු 10×5)

ආකෘති = 3

වර්ගය යුගල = 0

∴ හැඩය ත්‍රිකෝණීය වේ.

$\text{Cr}_2\text{O}_3 \text{ මවුල} = \frac{1.52\text{g}}{152\text{g mol}^{-1}}$
 $= 0.01\text{mol} \checkmark$
 $\text{H}_2\text{O} \text{ මවුල} = \frac{0.72\text{g}}{18\text{g mol}^{-1}}$
 $= 0.04\text{mol} \checkmark$
 $\text{N}_2 \text{ මවුල} = \frac{0.28\text{g}}{28\text{g mol}^{-1}}$
 $= 0.01\text{mol} \checkmark$


$\text{Cr}_2\text{O}_3 : \text{H}_2\text{O} : \text{N}_2 \text{ මවුල අනුපාතය,}$
 $0.01 : 0.04 : 0.01$

$1 : 4 : 1 \checkmark$


$\therefore$ අනුපාතය, $\text{Cr} : \text{H} : \text{N} : \text{O}$ පරමාණු මවුල
 $2 : 8 : 2 : 7$

$\therefore$ අනුපාතික ප්‍රමුඛ $\text{Cr}_2\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_7$. (ලකුණු 4+5=20)

$\times$ ඔබ අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රමුඛ, $\text{Cr}_2\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_7$



(ලකුණු 10).



(ලකුණු 30)

$\text{KMnO}_4 : \text{C}_2\text{O}_4^{2-} \text{ මවුල අනුපාතය,}$

(ලකුණු 15).

$2 : 5 \checkmark$

ප්‍රතිචක්‍රයේ 25cm³ අනුපාතයට වැඩි

$\text{C}_2\text{O}_4^{2-} \text{ මවුල} = \frac{0.02 \times 15}{1000} \checkmark$

$\therefore$ ප්‍රතිචක්‍ර 25cm³ තුළ KMnO_4 මවුල = $3 \times 10^{-4} \text{mol} \checkmark$
 $= \frac{3 \times 10^{-4} \text{mol} \times 2}{5} \checkmark$
 $= 1.2 \times 10^{-4} \text{mol} \checkmark$

ප්‍රතිචක්‍ර 100cm³ තුළ KMnO_4 මවුල = $\frac{1.2 \times 10^{-4} \text{mol} \times 100\text{cm}^3}{25\text{cm}^3} \checkmark$

$= 4.8 \times 10^{-4} \text{mol} \checkmark$

$\therefore$ නිශ්පාදනය තුළ ඇති KMnO_4 වර්තමානය,

$= 4.8 \times 10^{-4} \text{mol} \times 158\text{g mol}^{-1} \checkmark$

$= 0.07584\text{g}$

$= 75.84\text{mg} \checkmark$

KMnO_4 ඔබ වර්තමාන ප්‍රතිශතය = $\frac{75.84\text{mg} \times 100\%}{200\text{mg}} \checkmark$

$= 37.92\% \checkmark$

(ලකුණු 5+12=55)

(ලකුණු 70)