

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved



විශ්ව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
 Provincial Department of Education - NWP
 විශ්ව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
 Provincial Department of Education - NWP
 විශ්ව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
 Provincial Department of Education - NWP
 විශ්ව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
 Provincial Department of Education - NWP
 විශ්ව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
 Provincial Department of Education - NWP

තෙවන වාර පරීක්ෂණය - 12 ශ්‍රේණිය - 2024
 Third Term Test - Grade 12 - 2024

විභාග අංකය:

රසායන විද්‍යාව - I

කාලය පැය 02 යි

උපදෙස්

- ආවර්තිකා වගුවක් සපයා ඇත.
- සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩදෙනු නොලැබේ.
- පිළිතුරු පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ විභාග අංකය ලියන්න.
- 01 සිට 50 තෙක් වූ එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරු වලින් නිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැලපෙන පිළිතුර තෝරාගෙන එය පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දක්වෙන උපදෙස් පරිදි (x) යොදා දක්වන්න.

සාර්වත්‍ර වායු නියතය $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ ඇවගාඩ්රෝ නියතය $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ප්ලැන්ක්ගේ නියතය $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$ ආලෝකයේ වේගය $= 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

- (01) ඉලෙක්ට්‍රෝනය පිළිබඳ පහත සොයා ගැනීම් සලකන්න.
- ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ආරෝපණය.
 - පරමාණුවක න්‍යෂ්ටිය වටා චලනය වන ඉලෙක්ට්‍රෝනයකට තරංගයක් ලෙස හැසිරිය හැකි බව.
- (1) ජේ.ජේ. තොම්සන්, ලුවී ඩී. බ්‍රෝග්ලි
 (2) රොබට් මිලිකන්, මැක්ස් ප්ලාන්ක්
 (3) ජේ.ජේ. තොම්සන්, මැක්ස් ප්ලාන්ක්
 (4) අර්නස්ට් රදර්ෆඩ්, ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්
 (5) රොබට් මිලිකන්, ලුවී ඩී. බ්‍රෝග්ලි
- (02) $n = 3$, $l = 1$, $m_l = 0$, $m_s = +\frac{1}{2}$ යන ක්වොන්ටම් අංක කුලකයේ නිරූපණය වන්නේ පහත කුමන ඉලෙක්ට්‍රෝනය ද?
- (1) 3p (2) 2p (3) 3d (4) 3s (5) 2p
- (03) හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවේ පහත කවර ශක්ති මට්ටම 2 ක් අතර සිදුවන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රමණයකදී අඩුම තරංග ආයාමයක් ඇති විද්‍යුත් චුම්භක විකිරණයක් මුදා හරීද?
- (1) $n = 2 \rightarrow n = 4$ (2) $n = 7 \rightarrow n = 3$ (3) $n = 8 \rightarrow n = 5$
 (4) $n = 2 \rightarrow n = 1$ (5) $n = 1 \rightarrow n = 2$
- (04) යටින් ඉරි ඇඳි මූලද්‍රව්‍යයේ ඔක්සිකරණ අංකය වැඩිවන පිළිවෙලට සකස් කර ඇත්තේ,
- (1) ClO_4^- , ClO_3^- , ClO_2 (2) MnO_4^- , MnO_2 , Mn^{2+}
 (3) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_2$, CrCl_3 (4) Na_2S , SCl_2 , SO_4^{2-}
 (5) N_2O_3 , NO_3^- , NO_2
- (05) සංයෝගයක් තුළ ස්කන්ධය අනුව කාබන් 72% ක් හයිඩ්‍රජන් 12% ක් ද, ඔක්සිජන් 16% ක් ද ඇත. මෙම සංයෝගයේ ආනුභවික සූත්‍රයේ පවතින C : H අතර අනුපාතය,
- (1) 1 : 1 (2) 1 : 2 (3) 1 : 6 (4) 6 : 1 (5) 2 : 1



- (06) NO_2^- , NO_2 , NO_2^+ යන ප්‍රභේද වල O - N - O බන්ධන කෝණය වැඩිවන පිළිවෙලට සකසා ඇත්තේ,
 (1) $\text{NO}_2 < \text{NO}_2^- < \text{NO}_2^+$ (2) $\text{NO}_2^+ < \text{NO}_2 < \text{NO}_2^-$ (3) $\text{NO}_2^- < \text{NO}_2 < \text{NO}_2^+$
 (4) $\text{NO}_2^+ < \text{NO}_2^- < \text{NO}_2$ (5) $\text{NO}_2^- < \text{NO}_2^+ < \text{NO}_2$

- (07) $[\text{Fe}(\text{SCN})(\text{H}_2\text{O})_5]\text{Cl}_2$ හි මධ්‍ය ලෝහ අයනයේ ඔක්සිකරණ අංකය හා සංගත අංකය වන්නේ,
 (1) +3, 2 (2) +3, 5 (3) +2, 6 (4) +2, 2 (5) +3, 6

- (08) Ne (නියෝන්) වායුවේ ඝනත්වය වැඩිම වන්නේ,

උෂ්ණත්වය	පීඩනය (Pa)
(1) 0 °C	1 x 10 ⁵
(2) 0 °C	2 x 10 ⁵
(3) 273 °C	1 x 10 ⁵
(4) 273 °C	2 x 10 ⁵
(5) 298 K	1 x 10 ⁵

- (09) පහත දැක්ව ඇසුරින් $\text{C (s, graphite)} \rightarrow \text{C (s, diamond)}$ යන ප්‍රතික්‍රියාවේ සම්මත ප්‍රතික්‍රියා එන්තැල්පිය ($\Delta H_{\text{rxn}}^\circ$) සොයන්න.

මූල ද්‍රව්‍යය	සම්මත දහන එන්තැල්පිය / kJ mol^{-1}
C (s, graphite)	- 393
C (s, diamond)	- 395

- (1) -2 (2) +788 (3) -788 (4) +2 (5) 0

- (10) X නැමැති අවර්ණ සංයෝගය තදින් රත් කළ විට වර්ණවත් වායුවක් ලබාදේ. X පහන් සිඵ පරීක්ෂාවේ දී කහ පැහැති කොළ දෑල්ලක් ලබා දේ. X විය හැක්කේ,

- (1) $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ (2) $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ (3) $\text{Ba}(\text{NO}_2)_2$ (4) $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ (5) CuBr_2

- (11) පහත සඳහන් අණු අතරින් නිර්ද්‍රැවීය අණුවක් වන්නේ,

- (1) CHCl_3 (2) CO (3) SF_6 (4) SF_4 (5) H_2O

- (12) Ba (බේරියම්) හා එහි සංයෝග සම්බන්ධ අසත්‍ය ප්‍රකාශ වන්නේ,

- (1) Ba ලෝහය වාතයේ දහනය කර ලැබෙන ශේෂයට ජලය එක් කළ විට පැහැදිලි ද්‍රාවණයක් ලැබේ.
 (2) Ba අඩංගු කාණ්ඩයේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් අතරින් වැඩිම භාස්මිකතාවයක් දක්වන්නේ $\text{Ba}(\text{OH})_2$ වේ.
 (3) Ba, අඩංගු කාණ්ඩයේ කාබනේට් අතරින් වැඩිම තාප ස්ථායී සංයෝගය වන්නේ BaCO_3 වේ.
 (4) Ba, වැඩිපුර O_2 තුළ දහනය කළ විට සුපර් ඔක්සයිඩයක් ලැබේ.
 (5) Ba අඩංගු කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය අතරින් වැඩිම සීඝ්‍රතාවයකින් ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා වන්නේ Ba වේ.

- (13) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \overset{\text{CH}_2 - \text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}} = \text{CH} - \overset{\text{H}}{\text{C}} - \text{CH}_2\text{OH}$ හි IUPAC නාමය වන්නේ,


- (1) 2 - ethyl - 4 - methylhex - 3 - en - 1 - 01 (2) 5 - ethyl - 4 - methylhex - 3 - en - 1 - 01
 (3) 3 - methy - 5 - ethylhex - 3 - en - 6 - 01 (4) 2 - ethyl - 4 - methylhex - 3 - ene - 1 - 01
 (5) 4 - ethyl - 3 - methylhex - 3 - ene - 6 - 01

- (14) වායුමය හයිඩ්‍රොකාබනයක හයිඩ්‍රජන් 14% පමණ ඇත. ස.උ.පී. හි දී එම වායුවේ 0.042 g ක පරිමාව 13.44 cm^3 විය. හයිඩ්‍රොකාබනයේ අණුක සූත්‍රය,
 (1) C_5H_{12} (2) C_5H_{10} (3) C_4H_8 (4) C_4H_{10} (5) C_5H_8
- (15) විද්‍යුත් චුම්භක විකිරණයක ෆෝටෝන මවුලයක අඩංගු ශක්තිය 203 kJ mol^{-1} වේ. මෙම කිරණයේ තරංග ආයාමය වන්නේ, (nm)
 (1) 459 (2) 589 (3) 671 (4) 781 (5) 856
- (16) පහත දක්වා ඇත්තේ සංයෝග 3 ක් පිළිබඳ තොරතුරු වේ. එම තොරතුරු වලට වඩාත්ම ගැලපෙන සංයෝග කාණ්ඩය වන්නේ,
 A - උභය ගුණික ඔක්සයිඩයකි.
 B - ඉලෙක්ට්‍රෝන උභය සංයෝගයකි.
 C - ප්‍රභල ඔක්සිකාරකයකි.
 (1) Al_2O_3 , BeCl_2 , $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ (2) BeO , AlCl_3 , KMnO_4 (3) K_2O , AlCl_3 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
 (4) ZnO , BeCl_2 , $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ (5) MgO , AlCl_3 , KMnO_4
- (17) මෙතේන් (CH_4) ක්ලෝරීනීකරණය වීමේදී දාම ප්‍රචාරණ පියවරක් වන්නේ,
 (1) $\text{Cl}_2 \rightarrow 2\dot{\text{Cl}}$ (2) $\dot{\text{C}}\text{H}_3 + \dot{\text{C}}\text{H}_3 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6$ (3) $\dot{\text{C}}\text{H}_3 + \dot{\text{Cl}} \rightarrow \text{CH}_3\text{Cl}$
 (4) $\dot{\text{C}}\text{HCl}_2 + \dot{\text{H}} \rightarrow \text{CH}_2\text{Cl}_2$ (5) $\dot{\text{C}}\text{H}_2\text{Cl} + \text{Cl} - \text{Cl} \rightarrow \text{CH}_2\text{Cl}_2 + \dot{\text{Cl}}$
- (18) NH_3 වායුව හා ඇමෝනියම් ලවණ පිළිබඳ අසත්‍ය වගන්තිය වන්නේ,
 (1) ඇමෝනියා වායුව පහසුවෙන් ජලයේ දියවී දුබල ලෙස භාස්මික ද්‍රාවණයක් සාදයි.
 (2) ඇමෝනියම් ලවණ, $\text{Ba}(\text{OH})_2$ සමග ප්‍රතික්‍රියාවෙන් $\text{NH}_3(\text{g})$ නිදහස් කරයි.
 (3) ඇමෝනියම් ලවණ සියල්ල පහසුවෙන් තාපය හමුවේ විශෝජනය වී NH_3 වායුව නිදහස් කරයි.
 (4) වියළි තත්වයේදී ලෝහ සමග ඇමෝනියා ඔක්සිකාරකයක් ලෙස ක්‍රියාකරයි.
 (5) ඇමෝනියා වායුව හා වැඩිපුර Cl_2 වායුව අතර ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ජලයේ විෂබීජ නාශකයක් නිපදවයි.
- (19) පොටෑසියම් සුපර් ඔක්සයිඩ (KO_2) හා $\text{CO}_2(\text{g})$ අතර ප්‍රතික්‍රියාව පහත පරිදි වේ.

$$4\text{KO}_2(\text{s}) + 2\text{CO}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{K}_2\text{CO}_3(\text{s}) + 3\text{O}_2(\text{g})$$
 $\text{KO}_2(\text{s})$ 2.84 g හා $\text{CO}_2(\text{g})$ 1.76 g ක් ප්‍රතික්‍රියා කරවන ලද ප්‍රතික්‍රියාවේ සීමාකාරී ප්‍රතික්‍රියකය හා සෑදෙන O_2 ස්කන්ධය පිළිවෙලින්, ($\text{K} = 39, \text{C} = 12, \text{O} = 16$)
 (1) KO_2 හා 0.48 g (2) KO_2 හා 4.8 g (3) CO_2 හා 0.24 g
 (4) CO_2 හා 0.96 g (5) KO_2 හා 0.96 g
- (20) 300 K උෂ්ණත්වයක පවතින He වායුවේ වර්ග මධ්‍යන්‍ය මූලවේගය සහිත O_2 වායුව පවතින උෂ්ණත්වය වන්නේ,
 (1) 1200 K (2) 2400 K (3) 12000 K (4) 2400 °C (5) 1000 K
- (21) 18 වන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය හා Xe සාදන සංයෝග පිළිබඳ අසත්‍ය වන්නේ,
 (1) Xe වල තාපාංකය He වලට වඩා වැඩිය.
 (2) XeO_3 අණුව තලීය ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයක් ගන්නා අතර Xe හි ඔක්සිකරණ අංකය +6 වේ.
 (3) XeF_2 අණුව නිර්ද්‍රවීය වේ.
 (4) සියළුම මූලද්‍රව්‍යයන්ට ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමේ එන්තැල්පි අගයන් ඇත.
 (5) කාණ්ඩයේ පහලට යන විට අයනීකරණ ශක්තිය අඩු වන බැවින් Xe, F_2 සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

- (22) $\text{H}_2\text{O(g)}$ හි සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය -242 kJ mol^{-1} වේ. $\text{H}_2(\text{g})$ හා $\text{O}_2(\text{g})$ සම්මත බන්ධන විඝයන එන්තැල්පි අගයන් පිළිවෙලින් $+436 \text{ kJ mol}^{-1}$ හා $+496 \text{ kJ mol}^{-1}$ වේ. $\text{H}_2\text{O(g)}$ හි O - H බන්ධනයේ මධ්‍යන්‍ය බන්ධන විඝයන එන්තැල්පිය වන්නේ, (kJ mol^{-1})
- (1) +587 (2) +463 (3) -463 (4) +926 (5) -926
- (23) කළු පැහැති අවක්ෂේපයක් හෝ සංයෝගයක් ලබා නොදෙන්නේ පහත කුමන අවස්ථාවේ දී ද?
- (1) ලෙඩ් ඇසිටේට් $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ ද්‍රාවණයක් හරහා H_2S වායුව යැවීම.
 (2) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ද්‍රාවණයකට $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ ද්‍රාවණයක් එකතු කර රත්කිරීම.
 (3) සාන්ද්‍ර H_2SO_4 හා සුක්‍රෝස් අතර ප්‍රතික්‍රියාව.
 (4) K_2SO_3 ද්‍රාවණයකට BaCl_2 ද්‍රාවණයක් එකතු කිරීම.
 (5) ආම්ලික මාධ්‍යයේ දී Cu^{2+} ජලීය ද්‍රාවණයක් හරහා H_2S වායුව යැවීම.
- (24) $\text{H}_2\text{O}_2(\text{aq})$ ද්‍රාවණයකින් 50 cm^3 ක් තනුක H_2SO_4 මගින් ආම්ලික කර වැඩිපුර KI ද්‍රාවණයක් සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරවන ලදී. එවිට නිදහස් වන I_2 සමඟ මුළුමනින්ම ප්‍රතික්‍රියා වීමට 0.01 mol dm^{-3} සාන්ද්‍රණය වන $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ද්‍රාවණයකින් 20 cm^3 ක් වැය විය. H_2O_2 ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය (mol dm^{-3})
- (1) 0.02 (2) 0.068 (3) 0.2 (4) 0.002 (5) 0.032
- (25) 298 K උෂ්ණත්වයක සංවෘත බඳුනක් තුළ ඇති $\text{CH}_4(\text{g})$ හා $\text{O}_2(\text{g})$ වායුව සමාන ස්කන්ධ ඇත. බඳුන තුළ ඇති $\text{O}_2(\text{g})$ හි ආංශික පීඩනය (P_{O_2}) හා බඳුන තුළ මුළු පීඩනය (P_{T}) අතර අනුපාතය වන්නේ,
- (1) 1 : 2 (2) 1 : 3 (3) 2 : 3 (4) 3 : 1 (5) 1 : 5
- (26) $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{SO}_3(\text{g}); \Delta H^\circ = -198 \text{ kJ mol}^{-1}$ යන ප්‍රතික්‍රියාව සම්බන්ධ සත්‍ය වන්නේ,
- (1) SO_2 2 mol ක් උත්පාදනය වීමේදී 396 kJ ක තාපයක් පරිසරයට නිදහස් කරයි.
 (2) මෙම ප්‍රතික්‍රියාව පහළ උෂ්ණත්ව වලදී ස්වයං සිද්ධ වේ.
 (3) මෙම ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්ට්‍රොපි වෙනස ධන අගයක් ගනී.
 (4) $\text{SO}_2(\text{g})$ මවුල එකක් සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතික්‍රියාවීමේදී 99 kJ ශක්තියක් පරිසරයෙන් අවශෝෂණය කරගනී.
 (5) මෙම ප්‍රතික්‍රියාව සියලුම උෂ්ණත්ව වලදී ස්වයංසිද්ධ වේ.
- (27) පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ,
- (1) NF_3 හි බන්ධන කෝණය NH_3 වල බන්ධන කෝණයට වඩා විශාල වේ.
 (2) මිනිරන් වල ඝනත්වය දියමන්ති වල ඝනත්වයට වඩා වැඩිය.
 (3) H_2O_2 යනු ඒක තලීය අණුවකි.
 (4) CO හි C හා O අතර බන්ධනය ත්‍රිත්ව බන්ධන ස්වරූපයක් ගනී.
 (5) වායුමය අවස්ථාවේදී AlCl_3 ද්වි අවයවක සාදන අතර එහි Al හි මුහුම්කරණය sp^2 වේ.
- (28) X නැමැති අකාබනික සංයෝගයක් වැඩිපුර NaOH සමඟ රත් කළ විට කටුක ගඳක් ඇති වායුවක් පිට විය. වායුව පිටවීම අවසන් වන තෙක් රත් කර එම මිශ්‍රණයට Al කුඩු කර එකතු කර නැවත රත් කළ විට ඉහත වායුවම නැවත පිට විය. X සංයෝගය විය හැක්කේ,
- (1) NH_4NO_3 (2) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ (3) NaNO_3 (4) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ (5) Na_2SO_3

(29) $\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$ ද්‍රාවණයක් පහත දැක්වෙන ප්‍රතික්‍රියා වලට භාජනය කරන ලදී.



A, B හා C ප්‍රභේද වල වර්ණ වන්නේ පිළිවෙලින්,

- (1) රතු දුඹුරු, රතු, කොළ (2) රතු දුඹුරු, රතු, කහ (3) කොළ, රතු, කහ
(4) කොළ, රතු, නිල් (5) රතු දුඹුරු, නිල්, කහ

(30) බ්‍රෝමීන් ($\text{Br}_2(l)$) හි සම්මත පරමාණුකරණ එන්තැල්පිය නිරූපණය වන තාප රසායනික සමීකරණය වන්නේ,

- (1) $\frac{1}{2}\text{Br}_2(g) \rightarrow \text{Br}(g)$ (2) $\text{Br}_2(l) \rightarrow \text{Br}_2(g)$ (3) $\frac{1}{2}\text{Br}_2(l) \rightarrow \text{Br}(g)$
(4) $\text{Br}_2(l) \rightarrow 2\text{Br}(g)$ (5) $\frac{1}{2}\text{Br}_2(l) \rightarrow \frac{1}{2}\text{Br}(g)$

අංක 31 සිට 40 තෙක් වූ එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති (a), (b), (c) සහ (d) යන ප්‍රතිචාර හතර අතුරෙන් එකක් හෝ වැඩි සංඛ්‍යාවක් හෝ නිවැරදිය. නිවැරදි ප්‍රතිචාරය / ප්‍රතිචාර කවරේදැයි තෝරා ගන්න.

(a) සහ (b) පමණක් නිවැරදි නම් (1) මතද,

(b) සහ (c) පමණක් නිවැරදි නම් (2) මතද,

(c) සහ (d) පමණක් නිවැරදි නම් (3) මතද,

(d) සහ (a) පමණක් නිවැරදි නම් (4) මතද,

වෙනත් ප්‍රතිචාර සංඛ්‍යාවක් හෝ සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදි නම් (5) මතද,

උත්තර පත්‍රයෙහි දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි ලකුණු කරන්න.

(31) එකම මුහුම්කරණ අවස්ථාවේ පවතින කාබන් (C) පරමාණු අඩංගු වන්නේ කුමන කාණ්ඩයේ / කාණ්ඩ වලද?

- (a) H_2CO , C_2H_2 (b) HCN , CO_2 (c) CH_4 , C_2H_4 (d) C_2H_6 , H_2CO





(32) විකිති ගුණයක් වන්නේ,

- (a) ස්කන්ධය (b) උෂ්ණත්වය (c) වර්තනාංකය (d) තාප ධාරිතාවය

(33) ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා විමෙන් එල ලෙස අම්ල 2 ක් ලබා දෙන්නේ,

- (a) N_2O_3 (b) PCl_5 (වැඩිපුර ජලය) (c) NO_2 (d) SCl_2

(34) පහත සංයෝග අතරින් ත්‍රිමාණ සමාවයවිකතාව දක්වන්නේ,



- (35) හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ සම්බන්ධ සත්‍ය වගන්තිය / වගන්ති වන්නේ,
- 17 වන කාණ්ඩයේ පහළට හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ වල බන්ධන දිග වැඩිවේ.
 - හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩවල තාපාංකය 17 වන කාණ්ඩයේ පහළට ක්‍රමයෙන් අඩුවේ.
 - 17 වන කාණ්ඩයේ පහළට යන විට හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩවල ආම්ලික ප්‍රභලතාවය වැඩිවේ.
 - හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ එකිනෙකින් වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට $\text{AgNO}_3(\text{aq})$ හා $\text{NH}_3(\text{aq})$ භාවිතා කළ හැක.
- (36) සෑම විටම සෘණ (-) අගයන් වන එන්තැල්පි විපර්යාසය / විපර්යාස වන්නේ,
- පරමාණුකරණ එන්තැල්පිය
 - දහන එන්තැල්පිය
 - වාෂ්පීකරණ එන්තැල්පිය
 - සජලන එන්තැල්පිය
- (37) $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ හා HBr අතර ප්‍රතික්‍රියාවෙන් පහත දැක්වෙන පරිදි ඵලයක් සෑදේ.
- $$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$$

(I)

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CHCH}_3 \\ | \\ \text{Br} \end{array}$$

(II)
- පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වන්නේ,
- මාකොනිකොෆ් නීතියට අනුව ප්‍රධාන ඵලය I වේ.
 - II ප්‍රධාන ඵලය වේ.
 - වඩා ස්ථායී අතරමැදි කාබො කැටායනයක් සෑදෙන්නේ II වන ඵලය සෑදෙන අවස්ථාවේදීය.
 - I හා II යන ඵල 2 කට සමාන ප්‍රමාණ වලින් සෑදේ.
- (38) ආන්තරික ලෝහ සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය වන්නේ,
- H_2SO_4 අම්ල නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ දී V_2O_5 උත්ප්‍රේරකයක් ලෙස භාවිතා කරයි.
 - ජලීය $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$ හා $\text{Sc}^{3+}(\text{aq})$ අයන අවර්ණ වේ.
 - සංගත සංකීර්ණ අයන සෑදීමේ හැකියාව ඇත්තේ ආන්තරික මූලද්‍රව්‍ය වලට පමණි.
 - ආන්තරික ලෝහ අයන සාදන සියළුම සංගත සංකීර්ණ වර්ණවත් වේ.
- (39) ජලීය Na_2CO_3 ද්‍රාවණයක $\text{Na}^+(\text{aq})$ අයන සංයුතිය 46 ppm වේ. මේ ද්‍රාවණයේ ඝනත්වය 1 g cm^{-3} නම්,
- $\text{Na}^+(\text{aq})$ සාන්ද්‍රණය $1 \times 10^{-4} \text{ moldm}^{-3}$ වේ.
 - $\text{CO}_3^{2-}(\text{aq})$ සාන්ද්‍රණය $1 \times 10^{-3} \text{ moldm}^{-3}$ වේ.
 - $\text{CO}_3^{2-}(\text{aq})$ සාන්ද්‍රණය 96 ppm වේ.
 - Na_2CO_3 සාන්ද්‍රණය $1 \times 10^{-4} \text{ moldm}^{-3}$ වේ.
- (40) පහත කවර ජලීය ද්‍රාවණ යුගලයක් මිශ්‍ර කළ විට වර්ණවත් අවක්ෂේප / අවක්ෂේපයක් ලැබේ ද?
- Na_2CO_3 හා H_2SO_4
 - NaI හා AgNO_3
 - BaCl_2 හා K_2CrO_4
 - CaCl_2 හා $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$

- අංක 41 - 50 තෙක් වූ ප්‍රශ්න සඳහා පහත උපදෙස් පිළිපදින්න.

ප්‍රතිචාරය	පළමුවැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
01	සත්‍යය	සත්‍ය වන අතර පළමුවැනි ප්‍රකාශය නිවැරදිව පහදා දෙයි.
02	සත්‍යය	සත්‍ය වන නමුත් පළමුවැන්න නිවැරදිව පහදා නොදේ
03	සත්‍යය	අසත්‍යය
04	අසත්‍යය	සත්‍යය
05	අසත්‍යය	අසත්‍යය

පළමුවන ප්‍රකාශය	දෙවන ප්‍රකාශය
(41) KMnO_4 ද්‍රාවණයක සාන්ද්‍රණය නිර්ණය කිරීමට ආම්ලික K $_2\text{C}_2\text{O}_4$ භාවිතා කළ හැක.	K $_2\text{C}_2\text{O}_4$ යනු ප්‍රාථමික සම්මතයකි.
(42) H_2O_2 වල තාපාංකය H_2O තාපාංකයට වඩා වැඩිය.	H_2O අණු මෙන්ම H_2O_2 අණු අතර ද H - බන්ධන පවතී.
(43) pentane (C_5H_{12}) හි තාපාංකය 2-methylbutane එල තාපාංකයට වඩා වැඩිය.	pentane හා 2-methylbutane යනු දාම සමාවයවික වේ.
(44) දියමන්ති යනු විද්‍යුත්‍ය සන්නයන නොකරන කාබන්වල බහුරූපී ආකාරයකි.	දියමන්ති වල ඇති C හි මුහුම්කරණ sp^2 වේ.
(45) හයිඩ්‍රජන් පරමාණුක වර්ණාවලිය රේඛා වර්ණාවලියකි.	වර්ණාවලියේ එක් එක් රේඛාව H - පරමාණුවේ එක් එක් ශක්ති මට්ටමකට අනුරූප වේ.
(46) BF_3 හා NH_3 අණුවල හැඩය තලීය ත්‍රිකෝණාකාර වේ.	BF_3 හා NH_3 යන අණු 2 කම විෂම පරමාණුක අණු වේ.
(47) HCO_3^- අයනයේ සියළුම C - O බන්ධන දිග සමානය.	HCO_3^- සඳහා ස්ථායී සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ 3 ක් ඇත.
(48) ක්ලෝරීන් (Cl) හි ඔක්සි අම්ලවල ආම්ලිකතාවය $\text{HOCl} < \text{HClO}_2 < \text{HClO}_3 < \text{HClO}_4$ ලෙස වෙනස් වේ.	ක්ලෝරීන් වල ඔක්සිකරණ අංකය වැඩි වන විට ආම්ලික ප්‍රභවතාවය වැඩිවේ.
(49) H_2S ඔක්සිහාරකයක් ලෙස පමණක් ක්‍රියා කරයි.	H_2S හි S පරමාණුවේ ඔක්සිකරණ අංකය -2 වේ.
(50) දෘඩ බඳුනක් තුළ ඇති පරිපූර්ණ වායුවක පීඩනය, උෂ්ණත්වය වැඩි කළ විට අඩුවේ.	උෂ්ණත්වය වැඩි කළ විට අණු අතර දුර වැඩිවේ.



සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved



විශ්ව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව Provincial Department of Education - NWP
 විශ්ව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව Provincial Department of Education - NWP
 විශ්ව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව Provincial Department of Education - NWP
 විශ්ව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව Provincial Department of Education - NWP
 විශ්ව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව Provincial Department of Education - NWP

තෙවන වාර පරීක්ෂණය - 12 ශ්‍රේණිය - 2024
 Third Term Test - Grade 12 - 2024

විභාග අංකය:

රසායන විද්‍යාව - II

කාලය පැය 03 යි

අමතර කියවීම් කාලය මිනිත්තු 10 යි.

අමතර කියවීම් කාලය ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවා ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමටත් පිළිතුරු ලිවීමේ දී ප්‍රමුඛත්වය දෙන ප්‍රශ්න සංවිධානය කර ගැනීමටත් යොදා ගන්න.

- ආවර්තිතා වගුවක් 15 වැනි පිටුවෙහි සපයා ඇත.
- ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ දෙනු නොලැබේ.
- සාර්වත්‍ර වායු නියතය, $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- ඇවගාඩරෝ නියතය, $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු සැපයීමේදී ඇල්කයිල් කාණ්ඩ සංක්ෂිප්ත ආකාරයකින් නිරූපණය කළ හැකි ය.



A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා (පිටු 02 - 08)

- සියලුම ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න.
- ඔබේ පිළිතුරු එක් එක් ප්‍රශ්නයට ඉඩ සලසා ඇති තැන්වල ලිවිය යුතු ය. මේ ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිතුරු ලිවීමට ප්‍රමාණවත් බවද දීර්ඝ පිළිතුරු බලාපොරොත්තු නොවන බවද සලකන්න.

B කොටස සහ C කොටස - රචනා (පිටු 09 - 14)

- එක් එක් කොටසින් ප්‍රශ්න දෙක බැගින් තෝරා ගනිමින් ප්‍රශ්න හතරකට පිළිතුරු සපයන්න. මේ සඳහා සපයනු ලබන කඩදාසි භාවිත කරන්න.
- සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු A, B සහ C කොටස් තුනට පිළිතුරු A කොටස මුලින් තිබෙන පරිදි එක් පිළිතුරු පත්‍රයක් වන සේ අමුණා විභාග ශාලාධිපතිට භාර දෙන්න.

පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි.

කොටස	ප්‍රශ්න අංකය	ලැබූ ලකුණු
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
C	8	
	9	
	10	
එකතුව		

එකතුව

ඉලක්කමෙන්	
අකුරින්	

සංකේත අංක

උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 1	
උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 2	
පරීක්ෂා කළේ :	
අධීක්ෂණය කළේ :	



ව්‍යුහගත රචනා**(A කොටස)**

ප්‍රශ්න 4ටම මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න.

(01) (a) දී ඇති සහ සංයෝග ඇසුරෙන් පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.

සැ.යු. එක් සංයෝගයක් එක් වරක් පමණක් භාවිතා කරන්න.





- (i) තාප ස්ථායී සංයෝගයකි.
- (ii) සිසිල් ජලයේ අද්‍රාව්‍ය වන නමුත් උණු ජලයේ ද්‍රාව්‍ය සහ සංයෝගය
- (iii) ජලය හමුවේ රත් කරන විට වර්ණ විපර්යාසයක් ලබා දෙන සංයෝගය
- (iv) වායු අවස්ථාවේ දී ද්විඅවයවක සාදන සංයෝගය
- (v) සිසිල් ජලයේ අද්‍රාව්‍ය නමුත් තනුක HCl වලත් තනුක NaOH වලත් ද්‍රාව්‍ය සංයෝගය
.....
- (vi) තනුක HCl එකතු කරන විට වර්ණවත් වායුවක් පිටවන සංයෝගය

(1a. ලකුණු 4 x 6 = 24)

(b) (i) $(\text{CN}_3\text{H}_6)^+$ අයනය සඳහා වඩාත් පිළිගත හැකි ලිවිස් තිත් - ඉරි ව්‍යුහය අඳින්න.

(ii) ඉහත (i) හි අඳින ලද ලිවිස් තිත් - ඉරි ව්‍යුහය සඳහා තවත් ලිවිස් තිත් - ඉරි ව්‍යුහ (සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ) 02 ක් අඳින්න.

- (iii) පහත සඳහන් ලුවිස් තිත් - ඉරි ව්‍යුහය හා ලේබල් කරන ලද සැකිල්ල පදනම් කරගෙන දී ඇති වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.



	¹ C	² C	³ C	⁴ N	⁵ O
(I) පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය					
(II) පරමාණුව වටා හැඩය					
(III) ඔක්සිකරණ අංකය					

- කොටස් (iv) සහ (v) දෙන ලද ලුවිස් තිත් - ඉරි ව්‍යුහය මත පදනම් වේ. පරමාණු ලේබල් කිරීම (iii) කොටසෙහි ආකාරයටම වේ.

- (iv) පහත දැක්වෙන පරමාණු දෙක අතර සිග්මා බන්ධන සෑදීමට සහභාගී වන පරමාණුක / මුහුම් කාක්ෂික හඳුනා ගන්න.

(I) H - ¹ C	H -	¹ C -
(II) ¹ C - ² C	¹ C -	² C -
(III) ² C - ³ C	² C -	³ C -
(IV) ³ C - ⁴ N	³ C -	⁴ N -
(V) ³ C - ⁵ O	³ C -	⁵ O -

- (v) පහත දැක්වෙන ¹C, ²C, ³C, ⁵O, ⁴N පරමාණු වල විද්‍යුත් සෘණතාවය ආරෝහණය වන පිළිවෙලට සකසන්න.

.....

(1b. ලකුණු 52)

(c) වරහන් තුළ දක්වා ඇති ගුණය ආරෝහණය වන පිළිවෙලට සකසන්න.

(i) $\text{Cl}_2, \text{Ar}, \text{Al}, \text{Si}$ (ද්‍රවාංකය)

.....

(ii) $\text{CO}, \text{H}_2\text{CO}, \text{CH}_3\text{OH}, \text{HCO}_3^-$ (C හි ඔ'කරණ අංකය)

.....

(iii) $\text{MgCl}_2, \text{MgBr}_2, \text{MgI}_2, \text{MgF}_2$ (අයනික ස්වභාවය)

.....

(vi) B, O, F, N (දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය)

.....

(1c. ලකුණු 24)

(02)(a) X යනු ආවර්තිතා වගුවේ පරමාණුක ක්‍රමාංකය 20 ට අඩු s ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍යයකි. X හි පළමු අයනීකරණ ශක්තිය කාණ්ඩයේ ඉහළම අගය නොවේ. X වාතයේ දහනය කළ විට දීප්තිමත් සුදු දැල්ලක් සහිතව දහනය වී X_1 සුදු පැහැ අවශේෂයක් ලබා දෙයි. X සිසිල් ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා නොකරන අතර උණු ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර ජල අද්‍රාව්‍ය X_2 සුදු පැහැයට හුරු අවක්ෂේපයක් හා X_3 වායුව පිටකරයි. X, N_2 වායුව සමඟ රත්කළ විට X_4 නම් ස්ථායී සංයෝගයක් සාදයි. X_4 ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර X_2 හා කටුක ගන්ධයක් ඇති රතු ලිට්මස් නිල්පැහැ ගන්වන අවර්ණ X_5 වායුව පිටකරයි.

(i) X හා X_1 සිට X_5 විශේෂ හඳුනාගන්න.

X = ... X_3 -

X_1 = ... X_4 -

X_2 = ... X_5 -

(ii) X හි ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ලියන්න.

.....

(iii) පහත ප්‍රතික්‍රියා සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණ ලියන්න.

(I) X හා N_2 වායුව අතර -

(II) X හා උණු ජලය අතර -

(III) X_4 හා ජලය අතර -


(iv) X_5 වායුව හඳුනා ගැනීම සඳහා සරල පරීක්ෂාවක් හා එහි නිරීක්ෂණය ලියන්න.

.....







.....

(2a. ලකුණු 55)

- (b) (i) දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් සුදුසු ද්‍රාවණය තෝරාගෙන කොටුව තුළ ලිවීමෙන් පහත දී ඇති ප්‍රතික්‍රියා සම්පූර්ණ කරන්න. ද්‍රාවණ ලැයිස්තුව දී ඇත්තේ පිළිවෙලින් නොවේ.



සැ.යු. : එක් ද්‍රාවණයක් එක් වරක් පමණක් භාවිතා කළ යුතුය.



- (ii) A සිට F දක්වා ඇති අවක්ෂේප වල රසායනික සූත්‍ර ලියන්න.

A - D -

B - E -

C - F -

- (iii) ඉහත (b.i) හි ඇතිවන D හා F අවක්ෂේප ද්‍රාවණය වීමට අදාළ තුලිත රසායනික සමීකරණ ලියන්න.

.....

- (iv) C අවක්ෂේපය රත් කිරීමේදී සිදුවන ක්‍රියාවලිය සඳහා තුලිත රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න.

.....

(2b. ලකුණු 45)

- (03) (a) (i) ප්‍රොපේන් ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$)(g) වල සම්මත දහන එන්තැල්පිය අර්ථ දක්වන්න.

.....

- (ii) ප්‍රොපේන් වල සම්මත දහන එන්තැල්පිය නිර්ණය සඳහා කරන ලද පරීක්ෂණයක තොරතුරු පහත පරිදි වේ.

ස්කන්ධය මනින ලද ප්‍රොපේන් සිලින්ඩරයක් දාහකයකට සම්බන්ධ කර ජලය 400 cm^3 අඩංගු බීකරයක් එම දාහකයෙන් රත් කරන ලදී. ජලයේ උපරිම උෂ්ණත්වය 85°C වන අවස්ථාවේ දාහකය ක්‍රියා විරහිත කර ප්‍රොපේන් සිලින්ඩරයේ ස්කන්ධය නැවත මිනුම් කරන ලදී.

- සිලින්ඩරයේ ආරම්භක ස්කන්ධය = 1500 g
- සිලින්ඩරයේ අවසන් ස්කන්ධය = 1497.8 g
- කාමර උෂ්ණත්වය = 27°C
- ජලයේ සංඝනත්වය 1 g cm^{-3} ජලයේ වි.තා.ධා. $4.2 \text{ J g}^{-1} \text{ C}^{-1}$

ඉහත දත්ත යොදා ගෙන දහනයේදී පිටවන තාප ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න.

.....

- (iii) ප්‍රොපේන් වල සම්මත දහන එන්තැල්පිය ගණනය කරන්න.

.....

- (iv) ප්‍රොපේන් වල සම්මත දහන එන්තැල්පියේ සෛද්ධාන්තික අගය $-2220 \text{ kJ mol}^{-1}$ වේ. නම් ඉහත ඔබ ලබාගත් අගය හා මෙම අගය අතර වෙනසට හේතු දෙකක් ලියන්න.

.....

- (b) A සහ B ප්ලාස්තු දෙක පරිමාව නොගිනිය හැකි නලයකින් සම්බන්ධ කර ඇත. A ප්ලාස්තුවේ පරිමාව B හි පරිමාව මෙන් දෙගුණයකි. ආරම්භයේ දී කරාමය වසා ඇති අතර A ප්ලාස්තුව තුළ He මවුල 0.6 ක් හා B හි H_2 මවුල 0.3 ක් පවතී. A ප්ලාස්තුව තුළ පීඩනය $5 \times 10^4 \text{ Pa}$ හා උෂ්ණත්වය 300 K වන අතර B හි උෂ්ණත්වය 300 K වේ. ඉන්පසු කරාමය විවෘත කර A හා B ප්ලාස්තු වල උෂ්ණත්වය 400 K දක්වා වැඩිකරන ලදී.

- (i) ආරම්භයේ දී B ප්ලාස්තුවේ පීඩනය ගණනය කරන්න.

.....

(ii) A සහ B ප්ලාස්කුවල පරිමාව ගණනය කරන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

(iii) කරාමය විවෘත කර උෂ්ණත්වය ඉහළ නැංවූ පසු එක් එක් වායුවේ ආංශික පීඩන ගණනය කරන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

(iv) සම්බන්ධිත භාජනවල මුළු පීඩනය ගණනය කරන්න.

.....

.....


.....

.....

(v) ඔබ ගණනයේ දී සිදුකරන ලද උපකල්පනයක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....



යන ප්‍රතික්‍රියාව 300 K දී තාපදායක හා ස්වයංසිද්ධව සිදුවන බව පෙන්වන්න.

ප්‍රතික්‍රියාවේ සම්මත එන්ට්‍රොපි විපර්යාසය - 0.094 kJ mol⁻¹ K⁻¹ සහ CO₂ (g), O₂ (g) සහ CO (g) වල සම්මත ගිබ්ස් ශක්ති අගයන් පිළිවෙලින් - 394.4 kJ mol⁻¹, 0 kJ mol⁻¹ සහ 137.2 kJ mol⁻¹.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- (04) (a) P, Q සහ R යනු අණුක සූත්‍රය C_6H_{12} වන සමාවයවික හයිඩ්‍රොකාබන තුනකි. P සංයෝගය පාරත්‍රිමාණ සමාවයවිකතාවය දක්වන අතර Q සහ R සංයෝග එය නොදක්වයි. R ප්‍රතිරූප අවයව සමාවයවිකතාවය දක්වයි. Q සමාවයවිකය තුළ sp^2 මුහුම්කරණය වූ කාබන් පරමාණුවලට සෘජුවම බැඳුණු හයිඩ්‍රජන් පරමාණු එකක් පමණක් පවතී. P, Q හා R සංයෝග HBr සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කළ විට පිළිවෙලින් S, T සහ U සංයෝග ලබාදෙයි. S, T සහ U සංයෝග C_2H_5OH / KOH සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කිරීමෙන් පසු උත්ප්‍රේරිත හයිඩ්‍රජනීකරණය කළ විට, S හා T යන සංයෝග V ද U සංයෝගය W ද සාදයි. V සහ W යනු ස්ථාන සමාවයවික දෙකකි. P, Q, R, S, T, U, V සහ W හි ව්‍යුහ දක්වන්න.




P




Q




R



S



T



U




V



W

- (b) (i) පහත දී ඇති ප්‍රතික්‍රියා වලදී ලැබෙන A, B, C, D සහ E ප්‍රධාන ඵලයන් ඒවා සමඟ දී ඇති කොටු තුළ දක්වන්න.






C



D



E

- (ii) (I) ඉහත (i) I සහ IV ප්‍රතික්‍රියාවල ආරම්භක කාබනික සංයෝග එකිනෙකින් වෙන්කර හඳුනාගැනීම සඳහා එක් රසායනික පරීක්ෂාවක් දෙන්න.

.....

.....

- (II) ඉහත දී ඇති I - V දක්වා ප්‍රතික්‍රියා සඳහා ප්‍රතික්‍රියා වර්ගය A_N , A_E , S_N , S_E , E සහ O ලෙස අදාළ කොට තුළ ලියන්න.

නියුක්ලියෝෆිලික ආකලන (A_N)

ඉලෙට්‍රෝෆිලික ආකලන (A_E)

නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ (S_N)

ඉලෙට්‍රෝෆිලික ආදේශ (S_E)

ඉවත් කිරීම (E)

වෙනත් (O)

I. ප්‍රතික්‍රියාව

II. ප්‍රතික්‍රියාව

III. ප්‍රතික්‍රියාව

IV. ප්‍රතික්‍රියාව

V. ප්‍රතික්‍රියාව


(B කොටස) රචනා

● ප්‍රශ්න දෙකකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

- (05) (a) (i) තාත්වික වායුවල හැසිරීම විස්තර කෙරෙන වැන්ඩර්වාල්ස් සමීකරණය ලියා එහි පද හඳුන්වන්න.
- (ii) පරිපූර්ණ වායු මවුලයක් සඳහා වාලක ශක්තිය $KE = \frac{3}{2} RT$ බව පරිපූර්ණ වායු සමීකරණය හා වාලක අණුක වාදයේ සමීකරණය ඇසුරෙන් පෙන්වන්න.
- (iii) දෘඪ විදුරු බඳුනක 27°C ක උෂ්ණත්වයේ හා $3 \times 10^5 \text{ Pa}$ පීඩනයක් යටතේ N_2 වායු මවුල 0.3 ක් N_2O_3 වායු මවුල් 0.4 ක් හා He වායු මවුල 0.2 ක් අඩංගුව ඇත. පද්ධතිය 327°C ක උෂ්ණත්වයට රත් කර N_2O_3 වායුව එහි සංඝටක මූලද්‍රව්‍ය බවට සම්පූර්ණයෙන්ම තාප විශෝෂනය කරන ලදී. එහිදී ලැබෙන වායුමය පද්ධතිය 327°C උෂ්ණත්වයේම පවත්වා ගනිමින් එය සමග සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් Mg කුඩු සාම්පලයක් ඊට එකතු කරන ලදී. ප්‍රතික්‍රියාවෙන් පසු ලැබෙන ඝන ඵලයට ජලය එකතු කර එම පද්ධතිය නැවත 27°C දක්වා සිසිල් කරන ලදී. 27°C දී එහි වූ කිසිදු වායුවක් ජලයේ ද්‍රාවණය නොවන බව හා වායු පරිමාවට සාපේක්ෂව ද්‍රව හා ඝන වල පරිමා නොගිනිය හැකි බව ද උපකල්පනය කරන්න.
- (I) ඉහත ක්‍රියාපිළිවෙලෙහි ප්‍රතික්‍රියා සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණ ලියන්න.
- (II) ඉහත සම්පූර්ණ ප්‍රතික්‍රියාවට අවශ්‍ය වූ Mg ස්කන්ධය ගණනය කරන්න. (Mg = 24)
- (III) 27°C උෂ්ණත්වයේ වූ පද්ධතියේ පීඩනය ගණනය කරන්න.


(5a. ලකුණු 75)

- (b) පරිපූර්ණ ලෙස හැසිරෙන X(g) හා Y(g) අඩංගු පිළිවෙලින් A හා B ලෙස නම් කළ බල්බ 2 ක් පිළිබඳව ආරම්භක අවස්ථාවේ තොරතුරු පහත දැක්වේ.



බල්බ දෙක පරිමාව නොගිනිය හැකි තරම් වන සිහින් නලයකින් එකිනෙක සම්බන්ධ කර කරාමය වසා ඇත.

- (i) ආරම්භක X හා Y වායු මවුල සංඛ්‍යා ගණනය කරන්න.
- (ii) කරාමය විවෘත කළ පසු පද්ධතියේ මුළු පීඩනය ගණනය කරන්න.
- (iii) කරාමය විවෘත කළ පසු Y(g) හි ආංශික පීඩනය ගණනය කරන්න.
- (iv) කරාමය විවෘත කළ පසු X(g) හි මවුල භාගය ගණනය කරන්න.
- (v) පසුව බල්බ වල උෂ්ණත්වය 227°C දක්වා ඉහළ නැංවූ විට පහත ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවන්නේ යැයි උපකල්පනය කරන්න.



- (I) අවසන් පද්ධතියේ මුළු වායු මවුල සංඛ්‍යාව ගණනය කරන්න.
- (II) A තුළ මුළු වායු මවුල සංඛ්‍යාව ගණනය කරන්න.
- (III) A තුළ පීඩනය ගණනය කරන්න.

(5b. ලකුණු 75)

(06) (a) පහත සඳහන් සම්මත එන්තැල්පි විපර්යාස අර්ථ දක්වා ඒවාට අදාළ තුලිත සමීකරණයක් සඳහා උදාහරණයක් බැගින් දෙන්න.

- සම්මත උූර්ධවපාතන එන්තැල්පි විපර්යාසය.
- සම්මත පරමාණුකරණ එන්තැල්පි විපර්යාසය.
- සම්මත ප්‍රථම ඉලෙක්ට්‍රෝනය ලබාගැනීමේ එන්තැල්පි විපර්යාසය.

(6a. ලකුණු 30)

(b) පහත දැක්වෙන ප්‍රතික්‍රියා සලකන්න. දත්ත සපයා ඇත්තේ සම්මත අවස්ථාව සඳහා නොවේ.

	ΔH (kJ mol ⁻¹)	ΔS (J K ⁻¹ mol ⁻¹)
$2\text{Fe(s)} + \frac{3}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})$	-824	-274
$\text{C(s)} + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO(g)}$	-110	10

(i) $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3 \text{C(s)} \rightarrow 2 \text{Fe(s)} + 3 \text{CO(g)}$ යන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා ΔH හා ΔS ගණනය කරන්න.

ΔS හි ලකුණ සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාව හා එකඟ වේදැයි හේතු සහිතව සඳහන් කරන්න.

(ii) ඉහත b. i. කොටසට අදාළ ප්‍රතික්‍රියාව 27°C දී ස්වයංසිද්ධවේ දැයි සුදුසු ගණනය කිරීමක් භාවිතයෙන් පුරෝකථනය කරන්න.

(6b. ලකුණු 45)

(c) සපයා ඇති තාපරසායනික දත්ත භාවිතයෙන් MgBr_2 සහයේ සම්මත දැල්ස් විඝටන එන්තැල්පි විපර්යාසය බෝන් හේබර් චක්‍රයක් භාවිතයෙන් ගණනය කරන්න.

$\text{MgBr}_2(\text{s})$ සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය $= -524 \text{ kJ mol}^{-1}$

Mg(g) පළමු හා දෙවන අයනීකරණ එන්තැල්පිය පිළිවෙලින් $= 738 \text{ kJ mol}^{-1}$ හා 1451 kJ mol^{-1}

Mg(s) සම්මත උූර්ධවපාතන එන්තැල්පිය $= 146 \text{ kJ mol}^{-1}$

$\text{Br}_2(\text{l})$ සම්මත වාෂ්පීකරණ එන්තැල්පිය $= 31 \text{ kJ mol}^{-1}$

$\text{Br}_2(\text{g})$ සම්මත බන්ධන විඝටන එන්තැල්පිය $= 193 \text{ kJ mol}^{-1}$

Br(g) හි සම්මත ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබාගැනීමේ එන්තැල්පිය $= -325 \text{ kJ mol}^{-1}$

(6c. ලකුණු 75)

(07) (a) 3d ආන්තරික මූලද්‍රව්‍යයක් වන M හි ඉහළම ඔක්සිකරණ අංකය, M අයන් කාණ්ඩයේ අංකයට සමාන වේ. M සාදන M^{2+} අයනය ජලය සමග P නම් ජලීය සංකීර්ණය සාදයි. ($\text{P} = [\text{M}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$) එය පහත ප්‍රතික්‍රියාවලට භාජනය කරන ලදී.

* සාන්ද්‍ර HCl සමඟ කහ පැහැති Q සංකීර්ණය සාදයි.

* NaOH සමඟ R සහ සංයෝගය සාදයි.


* වැඩිපුර ඇමෝනියා හමුවේ ද R සහ සංයෝගය සාදයි.

M හි ඉහළම ඔක්සිකරණ අංකයෙන් ව්‍යුත්පන්න වන ප්‍රබල ඔක්සිකාරකයක් ලෙස ක්‍රියා කරන ඔක්සි ඇනායනය T වේ.

T තනුක H_2SO_4 මගින් යන්ත්‍රමත් ආම්ලික කර සාන්ද්‍ර KOH ද්‍රාවණයක් එක් කළ විට U සාදයි.

U, පළමු හා දෙවන ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය දෙකකින් සෑදුණු සහ සංයුජ සංයෝගයක් වන X සමඟ භාස්මික මාධ්‍යයේදී ප්‍රතික්‍රියා කරනු විට S සහ සංයෝගය සෑදේ.

- (i) M ලෝහය හඳුනා ගන්න.
- (ii) M^{2+} අයනයේ ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය ලියන්න.
- (iii) P, R, S, T, U රසායනික සූත්‍ර හා වර්ණ ලියන්න.
- (iv) X හඳුනාගන්න.
- (v) P හා Q හි IUPAC නාමයන් ලියන්න.
- (vi) පහත ප්‍රතික්‍රියා සඳහා තුලිත අයනික සමීකරණය ලියන්න.



- (b) X නැමැති සහයේ FeSO_3 හා CuSO_3 හා නිෂ්ක්‍රීය ද්‍රව්‍යයක් අන්තර්ගත වේ. X වල FeSO_3 හා CuSO_3 ස්කන්ධ ප්‍රතිශත නිර්ණය කිරීමට පහත ක්‍රියා පිළිවෙල යොදා ගන්නා ලදී.
ක්‍රියා පිළිවෙල,

X සහයේ 5g කොටසක් තනුක H_2SO_4 ආම්ලික ජලීය මාධ්‍යයක දියකර $0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ KMnO}_4$ 200 cm^3 මගින් පිරියම් කරන ලදී. මෙම ප්‍රතික්‍රියාවේදී ප්‍රතිඵල ලෙස Fe^{3+} , Mn^{2+} , SO_4^{2-} හා Cu^{2+} ඵල ලෙස ලබා දුන්. වැඩිපුර ඇති KMnO_4 $0.3 \text{ mol dm}^{-3} \text{ Fe}^{2+}$ ද්‍රාවණයක් මගින් අනුමාපනය කරන ලදී. අනුමාපනයේ දී වැය වූ Fe^{2+} පරිමාව 100 cm^3 විය. ආම්ලික මාධ්‍යයේ දී SO_3^{2-} අයනය, $\text{SO}_2(\text{g})$ බවට පත්වීමෙන් වන බලපෑම නොසලකා හරින්න.


(Fe = 56, S = 32, O = 16, Cu = 63.5)

- (i) FeSO_3 හා KMnO_4 අතර,
- (ii) CuSO_3 හා KMnO_4 අතර,
- (iii) FeSO_3 හා CuSO_3 හා ස්කන්ධ ප්‍රතිශත ගණනය කරන්න.

C කොටස - රචනා

- ප්‍රශ්න දෙකකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

- (08) (a) (i) $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$ භාවිතා කරමින් පහත දැක්වෙන ප්‍රතික්‍රියා අනුක්‍රමයට අනුව Q සංයෝගය පිළියෙල කර ඇත.





A, B, C, D හා E සංයෝග සහ 1 සිට 5 දක්වා පියවර වලට අදාළ ප්‍රතිකාරක හඳුනාගන්න. ප්‍රතිකාරක වශයෙන් පහත දී ඇති රසායනික ද්‍රව්‍ය පමණක් තනිව හෝ සංයෝජන ලෙස භාවිතා කළ යුතුය.


රසායනික ද්‍රව්‍ය :-

තනුක H_2SO_4 , H_2 , HBr , $NaNH_2$, $Pd - BaSO_4$ / ක්විනොලින්


- (ii) පහත දැක්වෙන ප්‍රතික්‍රියා දාම සලකන්න. L හා M සංයෝග වල ව්‍යුහ අඳින්න. G, H, I, J සහ K ප්‍රතිකාරක දෙන්න.



- (b) (i) පහත දැක්වෙන පරිවර්තනය පියවර තුනකට නොවැඩි සංඛ්‍යාවකින් සිදුකරන්නේ කෙසේ දැයි පෙන්වන්න.



- (ii) පහත ප්‍රතික්‍රියාව සලකන්න.





- (I) මෙම ප්‍රතික්‍රියාව සිදුකිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන x සහ y රසායන ද්‍රව්‍යයන් හඳුනාගන්න.

- (II) මෙම ප්‍රතික්‍රියාවේ යාන්ත්‍රණය ලියන්න.

- (09) (a) P, Q, R, S, T, U ලෙස ලේබල් කළ $AgNO_3$, $Al(NO_3)_3$, $Pb(NO_3)_2$, $BaCl_2$, $ZnCl_2$, $CaCO_3$ (පිළිවෙලින් නොවේ) සහ ද්‍රව්‍ය හයක් සපයා ඇත. එම සංයෝග පහත පරීක්ෂණ වලට භාජනය කළ විට ලැබුණු නිරීක්ෂණය පහත වගුවේ දැක්වේ.

	පරීක්ෂණ	නිරීක්ෂණ
(1)	සංයෝග වෙන වෙනම ජලයේ දිය කරන ලදී.	P සංයෝගය පමණක් ජලයේ දිය නොවීය.
(2)	Q, R, S, T, U මගින් ලද ද්‍රාවණ වලට $Na_2S_2O_3$ ද්‍රාවණය එක් කරන ලදී.	Q, R ද්‍රාවණ වල සුදු අවක්ෂේප ඇති විය. Q මගින් ලැබෙන අවක්ෂේපය ටික වේලාවකින් කළු පැහැයට හැරුණි.
(3)	S, T, U ද්‍රාවණ වලට තනුක H_2SO_4 එක් කරන ලදී.	S මගින් තනුක HNO_3 තුළ අද්‍රාව්‍ය සුදු අවක්ෂේපයක් ලැබුණි.
(4)	T, U ද්‍රාවණ වලට NaOH බින්දුව බැගින් එක් කරන ලදී.	T හා U මගින් සුදු ජෙලටිනිය අවක්ෂේපය ලැබුණි.
(5)	ඉහත 4 දී ලැබුණු සුදු අවක්ෂේප වලට ජලීය NH_3 (වැඩිපුර) එක් කරන ලදී.	T මගින් ලැබුණු අවක්ෂේපය පමණක් සම්පූර්ණයෙන් දිය විය.

- (i) P, Q, R, S, T, U වෙන්කර හඳුනා ගන්න.
- (ii) R, Na₂S₂O₃ හමුවේ ලැබෙන අවක්ෂේපය රත් කළ විටදී ලැබෙන එල සඳහන් කරන්න.
- (iii) U, NaOH සමග සිදුකරන පහත ප්‍රතික්‍රියා සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණ ලියන්න.



- (iv) T, NaOH සමග ලැබෙන අවක්ෂේපය ජලීය NH₃ තුළ දියවීමට අදාළ තුලිත ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න.

- (b) ප්‍රාථමික සම්මත ද්‍රාව්‍යයක් වන සහ K₂Cr₂O₇ 4.704 g ක් 500 cm³ ජලය සම්පූර්ණයෙන් දියකරන ලදී. මෙම ද්‍රාවණයෙන් 25 cm³ ක් වෙන් කර තනුක H₂SO₄ මගින් ආම්ලික කර වැඩිපුර KI එක් කරන ලදී. මෙම ද්‍රාවණය සමග සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කිරීම සඳහා Na₂S₂O₃ 24 cm³ පරිමාවක් අවශ්‍ය විය.

- (i) ප්‍රාථමික සම්මත ද්‍රාව්‍යයක ලක්ෂණ 02 ක් ලියන්න.
- (ii) ඉහත ක්‍රියාවලියේ දී සිදු වන ප්‍රතික්‍රියා සඳහා තුලිත සමීකරණ ලියන්න.
- (iii) Na₂S₂O₃ සාන්ද්‍රණය ගණනය කරන්න. (K = 39, Cr = 52, O = 16)

- (10) (a) A හා B අෂ්ඨාංකීය ජ්‍යාමිතියක් ඇති සංකීර්ණ අයන අඩංගු සංගත සංයෝග දෙකකි. ඒවායේ අඩංගු පොදු පරමාණුක සංයුතිය CoN₅H₁₂Cl₂O₂ වේ. එක් එක් සංයෝගයේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු සියල්ල පවතිනුයේ NH₃ ලෙස පමණි. A සංයෝගය ජලීය AgNO₃ සමග සුදු අවක්ෂේපයක් ලබා නොදෙන අතර B සංයෝගය ජලීය AgNO₃ සමග තනුක NH₃ වල ද්‍රාව්‍ය සුදු අවක්ෂේපයක් ලබාදේ.

- (i) A සහ B වල ව්‍යුහ සූත්‍ර ලියන්න.
- (ii) A සහ B හි Co වල ඔක්සිකරණ අංකය ලියන්න.
- (iii) සංකීර්ණ අයනයේ Co හි ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ලියන්න.
- (iv) A හි අඩංගු NH₃ සියල්ල H₂NCH₂CH₂NH₂ සමග දහනය මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කරයි. එවිට M වටා අණුක ජ්‍යාමිතිය වෙනස් නොවේ. ලැබෙන නව සංකීර්ණ අයනයේ ව්‍යුහය අඳින්න.

- (b) එක්තරා අප ජල සාම්පලයක FeSO₃ සහ FeSO₄ මිශ්‍රණයක් අඩංගු වේ. එහි ඇති FeSO₃ හා FeSO₄ සාන්ද්‍රණ නිර්ණය කිරීම සඳහා පහත ක්‍රමවේද ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ක්‍රියා පිළිවෙල 01 :

ජල සාම්පලයෙන් 50 cm³ ක් වැඩිපුර 0.6 mol dm⁻³ H₂O₂ ද්‍රාවණ සමග මිශ්‍රකර ද්‍රාවණයක් පිළිවෙල කර ඇත. (A)

ක්‍රියා පිළිවෙල 02 :

A ද්‍රාවණයෙන් 50 cm³ ක නියැදියක් සමග සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට ආම්ලික 0.04 mol dm⁻³ KMnO₄ ද්‍රාවණ 25 cm³ ක් වැය විය.

1	1																	2		
	H																	He		
2	3	4													5	6	7	8	9	10
	Li	Be													B	C	N	O	F	Ne
3	11	12													13	14	15	16	17	18
	Na	Mg													Al	Si	P	S	Cl	Ar
4	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr		
5	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		
	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe		
6	55	56	La-	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86		
	Cs	Ba	Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn		
7	87	88	Ac-	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118		
	Fr	Ra	Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og		
	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71					
	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu					
	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103					
	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr					

