



වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

Provincial Department of Education - NWP 00371

13 ශ්‍රේණිය - තෙවන වාර පරීක්ෂණය - 2025

Third Term Test - Grade 13 - 2025

රසායන විද්‍යාව

I

Chemistry

I

02

S

I

පැය දෙකයි

Two Hours

නම / විභාග අංකය:

උපදෙස් :

- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය සමග ආවර්තිතා වගුවක් සපයා ඇත.
- සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ දෙනු නොලැබේ.
- පිළිතුරු පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ විභාග අංකය ලියන්න.
- 1 සිට 50 තෙක් වූ එක් එක් ප්‍රශ්නයට යන (1), (2), (3), (4), (5) පිළිතුරුවලින් නිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැලපෙන හෝ පිළිතුර තෝරාගෙන, එය උත්තර පත්‍රයේ පිටුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි කතිරයක් යොදා දක්වන්න.


සාර්වත්‍ර වායු නියතය $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$

ඇවගාඩරෝ නියතය $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

ප්ලාන්ක් නියතය $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$

ආලෝකයේ ප්‍රවේගය $C = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

- වායුගෝලීය පීඩනයේදී පහත දී ඇති සංයෝගවල තාපාංක විචලනය නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ,
P - H_2O (ද්‍රව) Q - HF (ද්‍රව) R - I_2 (ඝන) S - SbH_3 (වායු)
(1) $S < R < Q < P$ (2) $P < Q < R < S$ (3) $Q < P < S < R$
(4) $S < Q < P < R$ (5) $R < S < Q < P$
- සම්මත තත්ව යටතේ වායුමය උදාසීන මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවකට ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ලබා ගැනීමේදී ශක්ති අවශෝෂණයක් සිදුවන මූලද්‍රව්‍යක සංයුජතා කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය විය හැක්කේ,
(1) $2s^2 2p^1$ (2) $2s^2 2p^3$ (3) $3s^2 3p^3$ (4) $3s^2 3p^4$ (5) $3s^2 3p^5$
- පහත දී ඇති විශේෂ අතරින් $n + 2l \leq 7$ යන අවශ්‍යතාව සපුරන ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් අඩංගු වන්නේ,
(1) Sc^{3+} (2) Mn^{2+} (3) S^{2-} (4) K^+ (5) Ti^{4+}
- විද්‍යුත් චුම්භක විකිරණ කදම්භයක් මගින් ද්විපරමාණුක වායුවක බන්ධන බිඳ වායුමය පරමාණු බවට පත්කරයි. මෙම වායුවේ සම්මත බන්ධන විඝටන එන්තැල්පිය $\Delta H_D^\circ = + 249.4 \text{ kJmol}^{-1}$ නම් එම විකිරණ අයත් වන විද්‍යුත් චුම්භක වර්ණාවලියේ ප්‍රදේශය වන්නේ,
(1) පාරජම්බුල ප්‍රදේශය (2) අධෝරක්ත ප්‍රදේශය (3) දෘශ්‍ය ප්‍රදේශය
(4) ක්ෂුද්‍ර තරංග (5) රේඩියෝ තරංග
- පහත දී ඇති සංයෝගයේ නිවැරදි IUPAC නාමය වන්නේ,



- (1) amino - 2 - cyano - 2 formyl - 4 - ethylpent - 3 - ene
- (2) 3 - methyl - 5 - formyl - 5 cyanopentanamide
- (3) 2 - oxo - 2 - cyano - 4 - methylhex - 3 - enamide
- (4) 2 - cyano - 2 - formyl - 4 - methylhex - 3 - enamide
- (5) 2 - formyl - 2 - cyano - 4 - methyl - 3 - hexenamide

06. Ag^+ අයන සාන්ද්‍රණය $x \text{ moldm}^{-3}$ වූ ද්‍රාවණයක PbCl_2 සහ තත්ත්වයේ පවතී. මෙම ද්‍රාවණයේ උෂ්ණත්වය ක්‍රමයෙන් වැඩි කරගෙන යන විට එක්තරා උෂ්ණත්වයකදී AgCl අවක්ෂේප වීමට පටන් ගනී. මෙම උෂ්ණත්වයේදී AgCl(s) හි $K_{sp} = k$ නම් මෙම උෂ්ණත්වයේදී PbCl_2 හි K_{sp} වන්නේ,

- (1) $\frac{k^3}{x^3}$ (2) $\frac{2k^3}{x^3}$ (3) $\frac{k^3}{2x^3}$ (4) $\left(\frac{k}{2x}\right)^3$ (5) $\left(\frac{2k}{x}\right)^3$

07. පහත දී ඇති එක් එක් අයනයේ මධ්‍ය පරමාණුව වටා හැඩය හා බන්ධන කෝණයේ අගය යන දෙකම නිවැරදිව දී ඇති පිළිතුර වන්නේ,

	IO_3^+	IO_2^-	IO_3^-	IO_4^-
(1)	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර 120°	රේඛීය 180°	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර 120°	චතුස්තලීය 60°
(2)	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර 120°	කෝණික 105°	ත්‍රි ආනත පිරමීඩය 107°	චතුස්තලීය 109°
(3)	ත්‍රි ආනත පිරමීඩය 109°	චතුස්තලීය 109°	ත්‍රි ආනත පිරමීඩය 109°	සී සෝ 109°
(4)	ත්‍රි ආනත පිරමීඩය 107°	රේඛීය 180°	T හැඩය 90°	තලීය සමචතුරස්‍ර 90°
(5)	T හැඩය 90°	කෝණික 107°	සීසෝ 109°	ත්‍රි ආනත පිරමීඩය 107°

08. He, Li, Be, B සහ Na යන පරමාණුවල දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය අඩුවන පිළිවෙල වනුයේ,

- (1) $\text{Li} > \text{Na} > \text{He} > \text{B} > \text{Be}$ (2) $\text{Na} > \text{Li} > \text{He} > \text{Be} > \text{B}$ (3) $\text{He} > \text{Li} > \text{Be} > \text{B} > \text{Na}$
(4) $\text{He} > \text{Na} > \text{B} > \text{Be} > \text{Li}$ (5) $\text{B} > \text{Be} > \text{Na} > \text{Li} > \text{He}$

09. පහත දී ඇති Xe (Xenon) සාදන සංයෝග අතරින් සීසෝ හැඩති බන්ධන දිශානතියක් සහිත සංයෝගය වන්නේ,


- (1) XeF_4 (2) XeO_3 (3) XeO_4 (4) XeOF_2 (5) XeO_2F_2

10. $2\text{X(g)} + 2\text{Y(g)} \longrightarrow \text{Z(g)} \quad \Delta H^\circ > 0$

මෙම ප්‍රතික්‍රියාව T K උෂ්ණත්වයේ දී පහත යන්ත්‍රණයට අනුව පියවර 3 ක් ඔස්සේ සිදුවේ.

- (1) $\text{X(g)} + \text{Y(g)} \xrightarrow{E_{a1}} \text{P(g)}$
(2) $\text{P(g)} + \text{Y(g)} \xrightarrow{E_{a2}} \text{Q(g)}$
(3) $\text{Q(g)} + \text{X(g)} \xrightarrow{E_{a3}} \text{Z(g)}$

සමස්ත ප්‍රතික්‍රියාවේ සක්‍රීය ශක්තිය E_a ද සීග්‍රතා සමීකරණය $R = k [\text{X(g)}] [\text{Y(g)}]^2$ නම් ඊට වඩාත් ගැලපෙන ශක්ති පැතිකඩ වන්නේ,



11. සල්ෆර් අඩංගු නියැදියක 1.0 g ක් සම්පූර්ණයෙන් දහනය කළ විට එකම වායුමය ඵලය ලෙසට ලැබුණ කටුක ගඳක් සහිත වායුව $0.1 \text{ moldm}^{-3} \text{ NaOH}$ ද්‍රාවණ 500 cm^3 මගින් සම්පූර්ණයෙන්ම අවශෝෂණය කරන ලදී. ඉතිරි NaOH උදාසීන කිරීම සඳහා $1.0 \text{ moldm}^{-3} \text{ HCl}$ ජලීය ද්‍රාවණයකින් 24 cm^3 ක් අවශ්‍ය විය. ආරම්භක නියැදියේ වූ සල්ෆර් සංයුතිය pph වලින්, ($S = 32$)

- (1) 41.6 (2) 54.1 (3) 260 (4) 416 (5) 541

12. $(C_3H_{6(g)})$ ප්‍රාචීන් වායුවෙහි සම්මත දහන එන්තැල්පිය $kJ mol^{-1}$ වනුයේ,

$$\begin{aligned}\Delta H_D^0(C-C) &= +348 \text{ kJ mol}^{-1} & \Delta H_D^0(O=O) &= +495 \text{ kJ mol}^{-1} \\ \Delta H_D^0(C=C) &= +614 \text{ kJ mol}^{-1} & \Delta H_D^0(C=O) &= +1072 \text{ kJ mol}^{-1} \\ \Delta H_D^0(C-H) &= +413 \text{ kJ mol}^{-1} & \Delta H_D^0(H-O) &= +463 \text{ kJ mol}^{-1}\end{aligned}$$



- (1) -3440 (2) +3440 (3) -3668.5 (4) +5896.5 (5) +9336

13. පහත දී ඇති අම්ලවල ජලීය ද්‍රාවණ 0.1 moldm⁻³ NaOH(aq) ද්‍රාවණයක් සමග අනුමාපනය කළ විට සමකතා ලක්ෂ්‍යයේ දී pH අගයන් pH_1 , pH_2 , pH_3 ලෙස දී ඇත. ඒවා අතර නිවැරදි සම්බන්ධතාව වන්නේ,

I 0.1 moldm⁻³ CH₃COOH(aq) අම්ලය ($K_a = 1 \times 10^{-5}$ moldm⁻³) - pH_1











II 0.1 moldm⁻³ HCOOH(aq) අම්ලය ($K_a = 1 \times 10^{-4}$ moldm⁻³) - pH_2

III 0.1 moldm⁻³ HCl(aq) අම්ලය - pH_3

- (1) $pH_1 = pH_2 = pH_3$ (2) $pH_1 < pH_2 < pH_3$ (3) $pH_1 > pH_2 > pH_3$ (4) $pH_3 < pH_1 < pH_2$
(5) $pH_2 < pH_3 < pH_1$





ඉහත ප්‍රතික්‍රියා දාමයේ P හා Q ව්‍යුහයන් පිළිවෙළින් විය හැක්කේ,

- (1)  ,  (2)  , 
- (3)  ,  (4)  , 
- (5)  , 

15. ආම්ලික මාධ්‍යයේ සාන්ද්‍රණය 3.0 moldm⁻³ වූ KMnO₄ ද්‍රාවණයකින් 100 cm³ ද සාන්ද්‍රණය 5.0 moldm⁻³ වූ Xⁿ⁺ අයන ද්‍රාවණයකින් 100 cm³ ක් ද ප්‍රතික්‍රියා කරවීමේදී MnO₄⁻ අයන මගින් Xⁿ⁺ අයන XO₃⁻ බවට ඔක්සිකරණය කරයි නම් n හි අගය වන්නේ,


- (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5

16. $A + B \rightarrow C$ යන ප්‍රතික්‍රියාවේ නියත උෂ්ණත්වයේදී A හා B ප්‍රතික්‍රියකවලට සාපේක්ෂව පෙළ සෙවීමේ පරීක්ෂණයකදී පිළිවෙලින් B හා A හි සාන්ද්‍රණ නියතව පවත්වා ගිනිමින් ලබා ගන්නා පාඨාංක ඇසුරින් අදින ලද ප්‍රස්ථාර දෙකක් පහත දැක්වේ.




ඉහත ප්‍රතික්‍රියාව හා සම්බන්ධ අසත්‍ය ප්‍රකාශය

- (1) A ට සාපේක්ෂව පෙළ 1 වේ.
- (2) ප්‍රතික්‍රියාවේ වේග සමීකරණයට අදාළ වේග නියතයේ ඒකකය s^{-1} වේ.
- (3) ප්‍රතික්‍රියාව බහු පියවර ප්‍රතික්‍රියා යාන්ත්‍රණයක් ඔස්සේ සිදුවිය යුතුය.
- (4) B සහභාගි වන පියවරෙහි සක්‍රීයන ශක්තිය අනෙක් පියවරවල සක්‍රීයන ශක්තීන්ට වඩා වැඩිය.
- (5) ප්‍රතික්‍රියා යාන්ත්‍රණයේ B ඇතුළත් පියවර වේගවත් පියවරකි.




ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවේ ΔH_{rxn}° වන්නේ, kJ mol^{-1} වලින්

- (1) $b + 2a - (c + d)$ (2) $a + b + c - 2d$ (3) $2a - (b + c + d)$ (4) $b + c - (2a + d)$ (5) $(b + c + d) + 2a$
18. ඕනෑම උෂ්ණත්වයකදී ස්වයංසිද්ධ වන ප්‍රතික්‍රියාවක් පිළිබඳ පහත කුමන වගන්තිය සැම විටම සත්‍ය වේ ද
- (1) තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවක් විය යුතු අතර පද්ධතියේ අහඹුතාව වැඩි විය යුතුය.
 - (2) තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවක් විය යුතු අතර පද්ධතියේ අහඹුතාව වැඩි විය යුතුය.
 - (3) තාප දායක ප්‍රතික්‍රියාවක අහඹුතාව අඩු විය යුතුය.
 - (4) තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවක අහඹුතාව අඩු විය යුතුය.
 - (5) ප්‍රතික්‍රියාව තාප අවශෝෂක වීම හා අහඹුතාව නියතවීම.
19. සාන්ද්‍රණය $0.0121 \text{ mol dm}^{-3}$ වූ ඒක ආම්ලික දුබල භස්මය B හි ජලීය ද්‍රාවණයකින් 100 cm^3 සමග හෙක්සේන් 100 cm^3 හොඳින් සොලවා සමතුලිතවීමට තැබූ විට 25°C හි දී ජලීය ද්‍රාවණයේ $\text{pH} = 10$ විය. දුබල භස්මයේ $K_b = 1 \times 10^{-5}$ නම් හෙක්සේන් හා ජලීය ස්තරය අතර මෙම උෂ්ණත්වයේදී B හි ව්‍යාප්ති සංගුණකය K_D හි අගය වන්නේ,
- (1) 11 (2) 12 (3) 14 (4) 15 (5) 16
20. පරිපූර්ණ වායුවක් රූපසටහනේ දක්වා ඇති පරිදි පරිමාව නොගැනියහැකි සිහින් නලයකින් යා කරන ලද, පරිමාව $V \text{ m}^3$ හා $2V \text{ m}^3$ වූ A හා B බල්බ දෙකක් තුළ සිර කර ඇත. කරාමය වසා ඇති විට A බල්බය තුළ T උෂ්ණත්වයේ හා P_1 පීඩනයේදී ද, B බල්බය තුළ $2T$ උෂ්ණත්වයේ දී P_2 පීඩනයක් යටතේ ද වායුව තිබුණි.



බල්බ තුළ උෂ්ණත්වයන් එලෙසම පවත්වා ගනිමින් කරාමය විවෘත කළ විට පද්ධතියේ පීඩනය P_3 දක්වා වෙනස් වූ යේ නම් P_1 P_2 P_3 පීඩන අතර නිවැරදි සම්බන්ධතාව දැක්වෙන ප්‍රකාශය වන්නේ,

- (1) $\frac{P_1}{P_2} = 2P_3$ (2) $P_1 + 3P_2 = 4P_3$ (3) $2P_1 + 4P_2 = 6P_3$
- (4) $P_1 + 4P_2 = 5P_3$ (5) $\frac{P_1}{2} + 3P_2 = 5P_3$




ඉහත ප්‍රතික්‍රියා අණුකූලයේ A, B හා C විශේෂ නිවැරදි පිළිවෙලින් දක්වා ඇත්තේ,

A	B	C
(1) C_6H_5COOH	$LiAlH_4 / H_2O$	ක. NaOH
(2) C_6H_5COOH	i. $LiAlH_4$ /ඊතර ii. H^+ / H_2O	H^+ / CrO_3
(3) $C_6H_5CH_2CH_3$	i. $LiAlH_4$ /ඊතර ii. H^+ / H_2O	ක. NaOH
(4) $C_6H_5CH(CH_3)_2$	i. $LiAlH_4$ /ඊතර ii. H^+ / H_2O	PCC
(5) $C_6H_5CH_3$	PCC	i. $LiAlH_4$ /ඊතර ii. H^+ / H_2O

22. එක්තරා ප්‍රතික්‍රියාවක වේග තීරක පියවර $2X \rightarrow Y + Z$ වශයෙන් සොයාගෙන ඇත. X හි සාන්ද්‍රණය 0.60 moldm^{-3} වන විට ප්‍රතික්‍රියාවේ සීග්‍රතාව $R \text{ moldm}^{-3}\text{s}^{-1}$ වේ නම් එම උෂ්ණත්වයේ දී ම X හි සාන්ද්‍රණය 0.12 moldm^{-3} වන විට ප්‍රතික්‍රියාවේ සීග්‍රතාව $\text{moldm}^{-3}\text{s}^{-1}$ වලින් විය හැක්කේ,

- (1) $0.02 R$ (2) $0.04 R$ (3) $0.2 R$ (4) $0.4 R$ (5) $0.5 R$

23. පහත දී ඇති සංයෝග අතරින් ත්‍රිමාණ සමාවයවිකතාව පෙන්වන සංයෝග වන්නේ,



- (1) a, b පමණි (2) b, c පමණි (3) a, b හා c පමණි
(4) c හා d පමණි (5) a හා c පමණි

24. තාත්වික වායුවක අවධි උෂ්ණත්වය සම්බන්ධයෙන් පහත කුමන වගන්තිය නිවැරදි වේ ද?

- (1) එය අන්තර් අණුක බල නොසලකා හැරිය හැකි වන උෂ්ණත්වය යි.
(2) එය වායුව ද්‍රවීකරණය කළ හැකි අඩුම පීඩනයට අදාළ උෂ්ණත්වය යි.
(3) එය වායුව එහි ඝන සමග සමතුලිතව ඇති උෂ්ණත්වය යි.
(4) එය වායු කලාපය හා ද්‍රව කලාපය සමතුලිතව පවතින ඉහළම උෂ්ණත්වය යි.
(5) එය ඕනෑම පීඩනයකදී වැන්ඩර්වාල්ස් සමීකරණය මගින් ලබාදෙන උෂ්ණත්වය යි.

25. $Pt(s) | Hg(l) | Hg_2Cl_2(s) | Cl^-(aq) | Cl_2(g) | Pt(s)$ යන අංකනයට අදාළ කෝෂය සඳා ඇත්තේ වායු ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් හා ලෝහ අද්‍රාව්‍ය ලවණ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් භාවිත කරමින් ය. ඒවායේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවයන් $0.27 V$ හා $1.36 V$ (පිළිවෙලින් නොවේ) ලෙස දී ඇත්නම් මෙම කෝෂයට අදාළ කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව හා විද්‍යුත් ගාමක බලය E°_{cell} නිවැරදිව දී ඇති පිළිතුර වන්නේ,

- (1) $Hg_2Cl_2(s) + Cl_2(g) \rightarrow 2Hg(l) + 2Cl^-(aq)$ $E^\circ = 1.63 V$ (2) $2Hg(l) + Cl_2(g) \rightarrow Hg_2Cl_2(s) + 2Cl^-(aq)$ $E^\circ = -1.09 V$
(3) $2Hg(l) + Cl_2(g) \rightarrow Hg_2Cl_2(s)$ $E^\circ = 1.09 V$ (4) $2Hg(l) + 2Cl(g) \rightarrow Hg_2Cl_2(s)$ $E^\circ = 1.09 V$
(5) $Hg_2Cl_2(s) \rightarrow 2Hg(l) + 2Cl^-(aq)$ $E^\circ = -1.63 V$

26. 600 K හි දී සංවෘත බදුනක් තුළ වායුමය AB මවුල එකක් රත් කළ විට සමතුලිත අවස්ථාවේ දී වායුවෙන් 50% ක් පහත සමීකරණයට අනුව විඝටනය වේ.








600 K හි දී සමතුලිතතාව සඳහා Kc හි අගය වනුයේ,

- (1) 0.10 (2) 0.125 (3) 0.25 (4) 0.5 (5) 1.5

27. NaOH හා Na_2CO_3 හි ජලීය ද්‍රාවණයක NaOH හා Na_2CO_3 අතර මවුල අනුපාතය 1 : 2 වේ. මෙම ද්‍රාවණයෙන් 25 cm^3 0.1 mol dm^{-3} HCl ද්‍රාවණයක් සමග ඊතොප්තලින් දර්ශකය වශයෙන් යොදා ගනිමින් අනුමාපනය කළ විට අන්ත ලක්ෂ්‍යදී HCl පරිමාව 15 cm^3 වේ. ඊතොප්තලින් වෙනුවට මෙහිල් ඔරෙන්ජ් දර්ශකය යොදා එම අනුමාපනය නැවත සිදුකළ විට අන්තලක්ෂ්‍යයේදී HCl පරිමාව cm^3 වලින්,

- (1) 15.00 (2) 20.00 (3) 25.00 (4) 30.00 (5) 40.00


28. X නම් කාබනික සංයෝගය ප්‍රතික්‍රියා මාධ්‍ය තුළ සාදාගත් නයිට්‍රස් අම්ලය සමග ප්‍රතික්‍රියාකර Y ලබා දේ. Y සංයෝගය ආම්ලික $K_2Cr_2O_7$ සමග ප්‍රතික්‍රියාකර Z ලබා දේ. Z 2, 4 - dinitrophenyl hydrazine සමග ප්‍රතික්‍රියාකර වර්ණවත් අවක්ෂේපයක් ලබාදෙන්නේ නම් X විය හැක්කේ,



29. ඝනත්වය 1.10 g cm^{-3} හා ස්කන්ධය අනුව 20% HNO_3 සහිත තනුක HNO_3 ද්‍රාවණ කුමන පරිමාවක HNO_3 11g ක් අඩංගු වේ ද?

- (1) 160 cm^3 (2) 150 cm^3 (3) 100 cm^3 (4) 50 cm^3 (5) 25 cm^3

30. N_2 වායු මවුල 0.01 ක් ද H_2 වායු මවුල 0.10 සහ NH_3 වායු මවුල 0.40 ක් 1.0 dm^3 වූ දෘඪ සංවෘත භාජනයක ට ඇතුළු කර උෂ්ණත්වය 500 K හි දී පහත ප්‍රතික්‍රියාවට අනුව සමතුලිත වීමට ඉඩ හැර ඇත.



ආරම්භයේ සිට සමතුලිත අවස්ථාව දක්වා පද්ධතියේ සිදුවිය හැකි වෙනස්කම් පිළිබඳව සත්‍ය ප්‍රකාශය වන්නේ,

- (1) ආරම්භයේ දී $Q_c > K_c$: N_2 සහ H_2 වායු මගින් NH_3 වායුව සාදමින් ඉදිරියට ප්‍රතික්‍රියාව වැඩිපුර සිදුවෙමින් සමතුලිතතාව ඇතිකර ගනියි.
- (2) ආරම්භයේදී $Q_c < K_c$: ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව දිරිමත් වෙමින් පද්ධතිය සමතුලිතතාව කරා ගමන් කරයි.
- (3) ආරම්භයේ දී $Q_c > K_c$: NH_3 මගින් N_2 හා H_2 සාදමින් ආපසු ප්‍රතික්‍රියාව දිරිමත් වී පද්ධතිය සමතුලිතතාව කරා ගමන් කරයි.
- (4) ආරම්භයේදී $Q_c < K_c$: වන බැවින් NH_3 මගින් N_2 හා H_2 වායු සාදන පසු ප්‍රතික්‍රියාව දිරිමත් වේ.
- (5) පද්ධතියේ $Q_c = K_c$ වේ.

- අංක 31 සිට 40 තෙක් වූ එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති (a), (b), (c) සහ (d) යන ප්‍රතිචාර හතර අතුරෙන් එකක් හෝ වැඩි සංඛ්‍යාවක් හෝ නිවැරදිය. නිවැරදි ප්‍රතිචාරය / ප්‍රතිචාර කවරේදැයි තෝරා ගන්න.

(a) සහ (b) පමණක් නිවැරදි නම් (1) මතද,

(b) සහ (c) පමණක් නිවැරදි නම් (2) මතද,

(c) සහ (d) පමණක් නිවැරදි නම් (3) මතද,

(d) සහ (a) පමණක් නිවැරදි නම් (4) මතද,

වෙනත් ප්‍රතිචාර සංඛ්‍යාවක් හෝ සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදි නම් (5) මතද,


උත්තර පත්‍රයෙහි දක්වෙන උපදෙස් පරිදි ලකුණු කරන්න.

ඉහත උපදෙස් සම්පිණ්ඩනය,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a සහ b පමණක් නිවැරදියි.	b සහ c පමණක් නිවැරදියි.	c සහ d පමණක් නිවැරදියි.	d සහ a පමණක් නිවැරදියි.	වෙනත් ප්‍රතිචාර සංඛ්‍යාවක් හෝ සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදියි.

31. නයිට්‍රජන්වල ඔක්සේ අම්ල සම්බන්ධව පහත දී ඇති ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ වන්නේ,
- සුර්යාලෝකයට නිරාවරණ වූ සාන්ද්‍ර නයිට්‍රික් අම්ලය විශෝජන ප්‍රතික්‍රියාව ඔක්සිකරණ ඔක්සිහරණ ප්‍රතික්‍රියාවකි.
 - නයිට්‍රික් අම්ලයේ විශෝජනය ද්විධාකරණයකි.
 - නයිට්‍රස් අම්ල විශෝජනයේදී HNO_3 හා NO ප්‍රතිඵල ලෙස ලබා දෙමින් ද්විධාකරණයක් සිදුවේ.
 - සාන්ද්‍ර නයිට්‍රික් අම්ලය S සමග ප්‍රතික්‍රියාවේ දී H_2SO_4 ප්‍රතිඵලයකි.


32.



ඉහත ව්‍යුහයේ,

- කාබන් පරමාණු a, b, c හා d එකම තලයේ පවතී.
 - a, b, හා d කාබන් පරමාණු වල විද්‍යුත් ඍණතාව ආරෝහණය වන පිළිවෙළ $d < b < a$ ලෙස වේ.
 - සියළුම C - H බන්ධන දිග සර්වසම වේ.
 - සියළුම H පරමාණු එකම තලයක නොපිහිටයි.
33. පහත දී ඇති සංයෝගය සම්බන්ධයෙන් කුමන ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ සත්‍ය වේ ද?
- $\text{HC} \equiv \text{C} - \text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$
- Hg_2Cl_2 හමුවේ තනුක H_2SO_4 සමග පිරියම් කළ විට, වොලන්ස් ප්‍රතිකාරකය සමග රත් කිරීමේදී රිදී කැඩපතක් නිරීක්ෂණය කළ හැකි සංයෝගයක් ලබා දේ.
 - සෝඩියම් සමග ප්‍රතික්‍රියාකර H_2 වායුව මුක්ත කරයි.
 - NaNO_2 / ජලීය HCl සමග N_2 මුක්ත කරයි.
 - ජලීය NaOH සමග රත්කළ විට NH_3 පිට කරයි.
34. 3d ශ්‍රේණියේ මූලද්‍රව්‍යවල රසායනය සම්බන්ධව පහත දී ඇති ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය ප්‍රකාශය/ ප්‍රකාශ වන්නේ,
- Cr^{3+} හා Ni^{2+} අයන අඩංගු ජලීය ද්‍රාවණයකට වැඩිපුර H_2O_2 සහ NaOH එකතු කළ විට කොළ පැහැති අවක්ෂේපයක් හා කහ පැහැති ද්‍රාවණයක් සෑදේ.
 - Cr හා Mn හි උභයගුණි ඔක්සයිඩ වර්ණවත්ය.
 - සාන්ද්‍ර HCl සමග ප්‍රතික්‍රියාවෙන් කහ පැහැති ක්ලෝරයිඩ් සංකීර්ණ සාදන්නේ Ni^{2+} හා Cu^{2+} අයන පමණි.
 - බීකරයක වූ Mn^{2+} හා Ni^{2+} අයන අඩංගු ආම්ලික ජලීය ද්‍රාවණයකට ජලීය Na_2S ද්‍රාවණයක් එකතු කළවිට තද පැහැති අවක්ෂේපයක් පතුලේ තැන්පත් වේ.

35. දී ඇති උෂ්ණත්වයකදී දෘඩ සංවෘත භාජනයක් තුළ SO_3 වායු මවුල 1 ක් ඇතුළු කර සමතුලිත වීමට හැරිය විට පහත ප්‍රතික්‍රියාව පරිදි සමතුලිතතාවයේ පවතී.



මෙම උෂ්ණත්වයේ දී භාජනය තුළට පිටතින් N_2 වායු මවුල 0.5 ක් එකතු කළ විට සමතුලිත පද්ධතියේ වෙනස් වන සාධක නිවැරදිව දක්වා අත්තේ,

- සමතුලිතතා නියතයේ අගය අඩු වේ.
 - සමතුලිතතා නියතයේ අගය වැඩි වේ.
 - සංඝටකවල ආංශික පීඩන අඩු වේ.
 - පද්ධතියේ මුළු පීඩනය වැඩි වේ.
36. පහත ප්‍රකාශ අතරින් වැරදි ප්‍රකාශ / ප්‍රකාශය වන්නේ,
- නයිට්‍රජන් හි ඔක්සයිඩ අතරින් හරිතාගාර ආවරණයට විශාල ලෙස දායක වන වායුව වන්නේ NO_2 වේ.
 - ජලතත්ව පරාමිතීන් ලෙස ජලයේ pH අගය, සන්තායකතාව, දියවූ ඔක්සිජන් (DO) වැනි සාධකද යොදා ගනියි.
 - අකුණු ගැසීමේදී ස්ථානීය අම්ල වැසි ඇතිවීමේ හැකියාව ඇත.
 - වර්තමානයේ රෝමන්තකයින්ගේ ගුද වාතයේ වූ මිනේන් ඕසෝන් වියන හායනයට දැඩි බලපෑමක් ඇති නොකරයි.
37. වායු සම්බන්ධව පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය/ වගන්ති නිවැරදි වේ ද?
- තාත්වික වායු නියැදියක අණු විවිධ වේගවලින් චලනය වන අතර පරිපූර්ණ වායු නියැදියක සියළුම අණු එකම වේගයෙන් චලනය වේ.
 - ඉතා ඉහළ පීඩනවලදී පරිපූර්ණ වායු ද්‍රවීකරණය කළ හැකිය.
 - පරිපූර්ණ වායුවක මැක්ස්වෙල් බෝලට්ස්මාන් වේග ව්‍යාප්ති වක්‍රයේ උපරිමය, ඉහළම වේග සහිත අණු භාගය සඳහා වේ.
 - තාත්වික වායුවක සම්පීඩ්‍යතා සාධකය පීඩනය මත රඳා පවතී.
38. A හා B ද්‍රව දෙක සියළු සංයුතිවල දී පරිපූර්ණ ද්වයංගි ද්‍රාවණයක් සාදයි. මෙම ද්‍රව දෙකෙහි තාපාංක A හි තාපාංකය (T_A) > B හි තාපාංකය (T_B) වේ නම් පහත කුමන ප්‍රකාශ / ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ ද?
- A හා B හි සම මවුල මිශ්‍රණයක් සහිත සංවෘත පද්ධතියක
- වාෂ්ප කලාපයේ A හා B හි සංයුතීන් සමාන වේ.
 - වාෂ්ප කලාපය තුළ A හි සංයුතිය > වාෂ්ප කලාපයේ B හි සංයුතිය වේ.
 - වාෂ්ප කලාපය තුළ B හි සංයුතිය > A හි සංයුතිය වේ.
 - ද්‍රව මිශ්‍රණය නැටවීමෙන්, A හි තාපාංකයට වඩා අඩු උෂ්ණත්වයකදී A හා B ද්‍රව එකිනෙකින් වෙන්කර ගත හැකිය.
39. පහත ප්‍රකාශ අතරින් NH_3 හා NF_3 සම්බන්ධව වැරදි ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශය වන්නේ,
- NH_3 හි බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණයට වඩා NF_3 හි බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණය දුර්වලය
 - NH_3 හි ද්විධ්‍රැව ඝූර්ණය NF_3 හි අගයට වඩා විශාලය
 - NF_3 හි බන්ධන කෝණය NH_3 හි බන්ධන කෝණයට වඩා විශාලය
 - NH_3 හි N හා H අතර විද්‍යුත් ඍණ හා වෙනස හා NF_3 හි N හා F අතර විද්‍යුත් ඍණතා වෙනස ආසන්නව සමාන ය.
40. Zn හා Cu හි ලෝහ - ලෝහ අයන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ භාවිතා කර 25°C හිදී ලවණ සේතුවක් ද යොදා ගනිමින් සාදන ලද විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයක් සම්බන්ධව පහත තොරතුරු ලබා දී ඇත. ඒ අතරින් නිවැරදි විය හැකි ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශය වන්නේ,
- $E^0 \quad \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) / \text{Cu}(\text{s}) = + 0.34 \text{ V}$
- $E^0 \quad \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) / \text{Zn}(\text{s}) = - 0.76 \text{ V}$
- කෝෂයේ විද්‍යුත් ගාමක බලය උෂ්ණත්වය සමග වෙනස් විය හැකිය.
 - Zn හා Cu ඉලෙක්ට්‍රෝඩවල ස්කන්ධ වෙනස් විය නොහැකිය.
 - Cu^{2+} ජලීය ද්‍රාවණයේ වර්ණය නොවෙනස්ව පවතී.
 - Zn^{2+} ජලීය ද්‍රාවණයේ ආරම්භක සාන්ද්‍රණය වෙනස් විය හැකිය.

- අංක 41 - 50 තෙක් වූ ප්‍රශ්න සඳහා පහත උපදෙස් පිළිපදින්න.

ප්‍රතිචාරය	පළමුවැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
01	සත්‍යය	සත්‍ය වන අතර පළමුවැනි ප්‍රකාශය නිවැරදිව පහදා දෙයි.
02	සත්‍යය	සත්‍ය වන නමුත් පළමුවැන්න නිවැරදිව පහදා නොදේ
03	සත්‍යය	අසත්‍යය
04	අසත්‍යය	සත්‍යය
05	අසත්‍යය	අසත්‍යය

	පළමු ප්‍රකාශය	දෙවන ප්‍රකාශය
41.	SCl_2 ජල විච්ඡේදනයේ දී ද්‍රාවණයේ ආවිලතාවයක් හට ගනී.	සංයෝගයක සහසංයුජ ලක්ෂණ අඩු වන විට ජල විච්ඡේදනය විම අපහසු වේ.
42.	$\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$ හා $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ආම්ලික මාධ්‍යයේ රත්කළ විට එතිල් එස්ටර් සාදයි.	ආම්ලික මාධ්‍යයේ $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$ සමග $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ප්‍රතික්‍රියාවේදී $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^-$ න්‍යෂ්ටිකාමී කාණ්ඩයක් ලෙස ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවක් මගින් එස්ටරයක් සෑදේ.
43.	ජලීය Na_2CO_3 ද්‍රාවණයක් HCl ආම්ලය මගින් අනුමාපනයකදී පළමු සමකතා ලක්ෂය සොයාගැනීමට ගිනෝජ්නලීන් දර්ශකය යොදාගත හැක.	HCO_3^- අයන ජල විච්ඡේදනය $\text{HCO}_3^-_{(aq)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} = \text{H}_2\text{CO}_{3(aq)} + \text{OH}^-_{(aq)}$ ලෙස සිදුවිය හැක.
44.	Cr^{3+} , Al^{3+} හා Fe^{3+} වල ජලීය ද්‍රාවණ වෙන් වෙන්ව $\text{NH}_4\text{OH}_{(aq)}$ ද්‍රාවණයක් සමග පිරියම් කල විට ස්ථිර අවක්ෂේප ලබා නොදේ.	Cr^{3+} , Al^{3+} හා Fe^{3+} ඒවායේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ලෙස අවක්ෂේප කර ගැනීමට NH_4OH සහ NH_4Cl මිශ්‍රණය යෙදිය යුතු වේ.
45.	ඉලෙක්ට්‍රෝගිලික ප්‍රතිකාරක සමග බෙන්සීන් ප්‍රතික්‍රියාකර ලබාදෙන්නේ ආදේශ එලවේ.	බෙන්සීන් සහ ඉලෙක්ට්‍රෝගිලිය අතර ප්‍රතික්‍රියාවෙන් සෑදෙන ඇරිල්කාබොකැටායන අතර මැදිය, එහි ධන ආරෝපණයේ විස්ථානගත විම නිසා ස්ථායී වේ.
46.	සංවෘත පද්ධතියක් විසින් පරිසරයෙන් තාපය අවශෝෂණය කළ විට පරිසරයේ එන්ට්‍රොපිය අඩුවේ.	එන්ට්‍රොපිය විත්ති ගුණයක් වුව ද එන්තැල්පිය සටනා ගුණයකි.
47.	H_2O_2 ඔක්සිකාරකයක් මෙන්ම ඔක්සිහාරකයක් ලෙසද ක්‍රියාකරයි.	පෙරොක්සයිඩ් අයනයේ ඔක්සිජන් පරමාණු දෙකෙහි ඔක්සිකරණ අවස්ථා දෙක -1 හා 0 වේ.
48.	ජලීය ද්‍රාවණයක pH අගය වෙනස්වන විට pOH අගය ද එකම සංඛ්‍යාවකින් වෙනස් වේ.	ද්‍රාවණයක H^+ අයන සාන්ද්‍රණය වෙනස්වන විට OH^- අයන සාන්ද්‍රණයද එම ප්‍රමාණයෙන්ම වෙනස් වේ.
49.	මිසෝන් ස්තරය ආරක්ෂා කර ගැනීමට ක්ලෝරෝෆ්ලුවෝරෝ (CFC) කාබන් සඳහා විකල්පයක් ලෙස හයිඩ්‍රොක්ලෝරෝෆ්ලුවෝරෝ කාබන් (HCFC) භාවිතා කරයි.	HCFC ශෝලීය උණුසුමට දායක වන වායුවකි.
50.	PVC යනු ආකලන බහු අවයවකයක් වන අතර තාප ස්ථාපන බහු අවයවකද වේ.	PVC හි ඒක අවයවිකය නියුක්ලියෝගිලික ආකලන සඳහා පහසුවෙන් යොමු වේ.



වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
Provincial Department of Education - NWP 00355

13 ශ්‍රේණිය - තෙවන වාර පරීක්ෂණය - 2025

Third Term Test - Grade 13 - 2025

02

S

II

රසායන විද්‍යාව
Chemistry

II
II

පැය තුනයි
Three Hours

අමතර කියවීම් කාලය - මි. 10 යි
Additional Reading Time - 10 minutes

නම / විභාග අංකය:

අමතර කියවීම් කාලය ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවා ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමටත් පිළිතුරු ලිවීමේ දී ප්‍රමුඛත්වය දෙන ප්‍රශ්න සංවිධානය කර ගැනීමටත් යොදා ගන්න.

- ආවර්තිතා වගුවක් 16 වැනි පිටුවෙහි සපයා ඇත.
- ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ දෙනු නොලැබේ.
- සාර්වත්‍ර වායු නියතය, $R = 8.314 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- ඇවගාඩ්රෝ නියතය, $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු සැපයීමේදී ඇල්කයිල් කාණ්ඩ සංක්ෂිප්ත ආකාරයකින් නිරූපණය කළ හැකි ය.



A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා (පිටු 02 - 09)

- සියලුම ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න.
- ඔබේ පිළිතුරු එක් එක් ප්‍රශ්නයට ඉඩ සලසා ඇති තැන්වල ලිවිය යුතු ය. මේ ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිතුරු ලිවීමට ප්‍රමාණවත් බවද දීර්ඝ පිළිතුරු බලාපොරොත්තු නොවන බවද සලකන්න.

B කොටස සහ C කොටස - රචනා (පිටු 10 - 16)

- එක් එක් කොටසින් ප්‍රශ්න දෙක බැගින් තෝරා ගනිමින් ප්‍රශ්න හතරකට පිළිතුරු සපයන්න. මේ සඳහා සපයනු ලබන කඩදාසි භාවිත කරන්න.
- සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු A, B සහ C කොටස් තුනට පිළිතුරු A කොටස මුලින් තිබෙන පරිදි එක් පිළිතුරු පත්‍රයක් වන සේ අමුණා විභාග ශාලාධිපතිට භාර දෙන්න.
- ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි B සහ C කොටස් පමණක් විභාග ශාලාවෙන් පිටතට ගෙන යාමට ඔබට අවසර ඇත.

පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි.

කොටස	ප්‍රශ්න අංකය	ලැබූ ලකුණු
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
C	8	
	9	
	10	
එකතුව		

එකතුව

ඉලක්කමෙන්	
අකුරින්	

සංකේත අංක

උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 1	
උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 2	
පරීක්ෂා කළේ :	
අධීක්ෂණය කළේ :	


ව්‍යුහගත රචනා
(A කොටස)

01. (a) පහත දී ඇති එක් එක් ප්‍රකාශය සත්‍ය හෝ අසත්‍ය බව සඳහන් කරන්න.

- (i) K, Sc, Sr අතරින් ඉහළම දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය ඇත්තේ K වලටය ()
- (ii) CCl_4 , CHCl_3 , CH_3Cl අතරින් වැඩිම ද්විධ්‍රැව සූර්යයක් ඇත්තේ CHCl_3 වලටය ()
- (iii) CH_4 , H_2S හා H_2O අතරින් කුඩාම බන්ධන කෝණය ඇත්තේ H_2S වලටය ()
- (iv) V^{3+} , Fe^{2+} , Cu^+ යන අයන අතරින් වැඩිම විද්‍යුත් ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවක් ඇත්තේ V^{3+} වටය ()
- (v) ෮ බන්ධන සෑදෙන්නේ මුහුම් කාක්ෂික දෙකක් හෝ පරමාණුක කාක්ෂිකයක් සමග මුහුම් කාක්ෂිකයක් අතිවිච්ඡේදනයෙන් පමණි. ()

(ලකුණු 25)

(b) $[\text{C N}_3 \text{O}_3 \text{H}_2]^-$ අයනය සඳහා සැකිල්ල පහත දැක්වේ.



(i) ඉහත අනුව සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ලුච්ස් ව්‍යුහය අඳින්න.


(ලකුණු 08)

(ii) C පරමාණුව ඔක්සිකරණ අංකය හා හැඩය ලියා දක්වන්න.

ඔක්සිකරණ අංකය හැඩය

(ලකුණු 02)

(iii) පහත දී ඇති ලුච්ස් ව්‍යුහය පදනම් කර ගනිමින් දී ඇති වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.



	O_1	N_2	C_3	C_4	C_6
පරමාණුව වටා VSEPR යුගල්					
ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය					
පරමාණුව වටා හැඩය					
ඔක්සිකරණ අංකය					
මුහුම්කරණය					

(ලකුණු 24)

(iv) ඉහත (iii) කොටසෙහි ලුච්ස් ව්‍යුහය පදනම් කරගෙන පහත දැක්වෙන පරමාණු දෙක අතර ෮ බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක/ මුහුම් කාක්ෂික හඳුනාගන්න

- (i) $\text{O}_1 - \text{N}_2$ O_1 N_2
- (ii) $\text{N}_2 - \text{C}_3$ N_2 C_3
- (iii) $\text{C}_4 - \text{C}_5$ C_4 C_5
- (iv) $\text{C}_5 - \text{C}_6$ C_5 C_6
- (v) $\text{C}_6 - \text{N}_7$ C_6 N_7


(ලකුණු 10)

(v) පහත පරමාණු අතර π බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක/ මූලාංග කාක්ෂික හඳුනාගන්න.

(i) $O_1 - N_2$	O_1	N_2	
$C_6 - N_7$	C_6	N_7	
	C_6	N_7	(ලකුණු 06)

(vi) C_3, C_4, C_5, C_6, N_7 පරමාණු වල විද්‍යුත් සාම්පතාව ආරෝහනය වන ආකාරය ලියන්න. (ලකුණු 04)

(c)



මෙම ව්‍යුහය සඳහා අදිය හැකි වෙනත් සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ තුනක් අඳින්න. ඒවායේ සාපේක්ෂ ස්ථායීතා ස්ථායී, අස්ථායී, අඩු ස්ථායී ලෙස දක්වන්න.

(ලකුණු 12)

(d) පහත ප්‍රභේදවල වරහන් තුළ දී ඇති ගුණය වැඩිවන ආකාරයට සකසන්න.

(i) $\text{NO}_4^{-3}, \text{NO}_3^-, \text{NO}_2^+, \text{NO}_2^-$ (බන්ධන කෝණය)

..... < < <

(ii) $\text{MgCO}_3, \text{BeCO}_3, \text{SrCO}_3, \text{BaCO}_3$ (තාප ස්ථායීතාව)

..... < < <

(iii) $\text{SO}_2, \text{SO}_4^{2-}, \text{SO}_3^{2-}, \text{SO}_3$ (බන්ධන කෝණ)

..... < < <

(ලකුණු 09)

02. (a) Y යනු රතු පැහැති සනයකි. එය තාප වියෝජනය කළ විට වායුමය ඵල දෙකක් හා කොළ පැහැ Z නම් සන සංයෝගය ලබා දේ. Y හි අන්තර්ගත ලෝහය ආම්ලික, භාෂ්මික සහ උභයගුණී ලෙස ඔක්සයිඩ් සාදයි. එම ලෝහය මගින් එකම ඔක්සිකරණ අංකය සහිත ඔක්සො ඇනායන දෙකක් සාදයි.

(i) Y හඳුනාගන්න (ලකුණු 05)

(ii) Z සනය හඳුනාගන්න (ලකුණු 05)

(iii) Y හි තාප වියෝජනය සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණය ලියන්න. (ලකුණු 08)

(iv) Y හි අන්තර්ගත ලෝහය විසින් සාදන ඔක්සයිඩ්වල රසායනික සූත්‍ර, ඔක්සිකරණ අංක සහ ආම්ලික, භාෂ්මික, උභයගුණී ස්වභාවය දක්වන්න.

ඔක්සයිඩයේ රසායනික සූත්‍රය	ඔක්සිකරණ අංක	ආම්ලික, භාෂ්මික, උභයගුණී ස්වභාවය

(ලකුණු 12)

(v) ඉහත ලෝහය අන්තර්ගත ඔක්සො ඇනායන දෙකෙහි රසායනික සූත්‍ර සහ ජලීය ද්‍රාවණවලදී ඒවායේ වර්ණ දක්වන්න.

(i) සූත්‍රය වර්ණය

(i) සූත්‍රය වර්ණය (ලකුණු 04)

(vi) Y තාප වියෝජනයේ දී පිටවන වායුමය ඵලයක් ඉහළ උෂ්ණත්වයේ දී Mg සමග ප්‍රතික්‍රියාකර X නම් සංයෝගය ලබා දේ. X ජලයට යෙදූ විට P නම් අවක්ෂේපය හා R නම් වායුව ලබා දේ.

(a) X, P, R හඳුනාගන්න.

X

P

R

(ලකුණු 06)

(b) X ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණය ලියන්න.

(ලකුණු 05)

(c) R වායුව හඳුනා ගැනීමට රසායනික පරීක්ෂාවක් ලියන්න.

(ලකුණු 05)

(b) A සිට E දක්වා වූ පරීක්ෂා නළ පහක පහත රසායන ද්‍රව්‍යවල ජලීය ද්‍රාවණ ඇත. (පිළිවෙලින් නොවෙ)

$\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$, NaBr , MnSO_4 , Na_2SO_3 , BaCl_2

	සංයෝගය	පරීක්ෂණය	නිරීක්ෂණය
1	A	• තනුක අම්ලයක් එකතු කිරීම	• ආම්ලික $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ හි වර්ණය විවර්ණ කරන කටුක ගන්ධයක් සහිත වායූක් පිටවේ.
2	B	• NH_4OH ද්‍රාවණයක් එකතු කිරීම	• පළමුව සුදු අවක්ෂේපයක් ලැබී එය වැඩිපුර NH_4OH හමුවේ දිය විය.
3	C	• NaOH ද්‍රාවණයක් එකතු කිරීම	• ක්‍රීම් පැහැ අවක්ෂේපයක් ලැබුණි. වාතයට නිරාවරණය කළ විට එය තද දුඹුරු පැහැයට හැරුණි.
4	D	• K_2SO_4 ද්‍රාවණයක් එකතු කිරීම	• 'තනුක HNO_3 හි අද්‍රාව්‍ය සුදු අවක්ෂේපයක් ලැබුණි.
5	E	• AgNO_3 ද්‍රාවණයක් එකතු කිරීම	• සාන්ද්‍ර NH_3 හි ද්‍රාව්‍ය ලා කහ අවක්ෂේපය ලැබුණි.

(i) A සිට E දක්වා වූ සංයෝග හඳුනාගන්න.

A

D

B

E

(ලකුණු 20)

C

(ii) අවක්ෂේප සෑදීමේ සඳහා වන සියලු ප්‍රතික්‍රියා සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණ ලියන්න. අවක්ෂේප දැක්වීමට ↓ සලකුණ භාවිත කරන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(ලකුණු 12)

(iii) A සංයෝගය ලබාදෙන වායුව සහ $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ අතර ආම්ලික මාධ්‍යයේ දී සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණය ලියන්න.

.....

.....

.....

.....

(ලකුණු 10)

(iv) 2 සහ 5 පරීක්ෂණ වල දී අවක්ෂේප දියවීම සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණ ලියන්න.

.....

.....

.....

.....

(ලකුණු 08)

03. (a) HA යනු K_a 1.9×10^{-5} වන ඒක භාෂ්මික දුබල අම්ලයකි. 0.1 mol dm^{-3} HA ද්‍රාවණයකින් 25.00 cm^3 අනුමාපන ප්ලාස්කුවකට ගෙන සුදුසු දර්ශකයක් හමුවේ 0.15 mol dm^{-3} NaOH ද්‍රාවණයක් සමග අනුමාපනය කරන ලදී.

(i) HA(aq) හි විසථනය සඳහා තුලිත සමීකරණය ලියා K_a සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.

..... (ලකුණු 10)

(ii) ඉහත HA(aq) ද්‍රාවණයෙහි ආරම්භක pH අගය ගණනය කරන්න.

.....
..... (ලකුණු 10)

(iii) ඉහත අනුමාපනයේ සමකතා ලක්ෂ්‍යයේදී වැයවන NaOH පරිමාව කොපමණද?

.....
..... (ලකුණු 05)

(iv) සමකතා ලක්ෂ්‍යයේදී ද්‍රාවණයේ pH අගය කොපමණද? ($K_w = 1 \times 10^{-14}$)

.....
..... (ලකුණු 10)

(v) සමකතා ලක්ෂ්‍යයේදී යොදන NaOH පරිමාව ඉක්මවා තවත් 10 cm^3 යෙදූ පසු ද්‍රාවණයේ pH අගය කොපමණද?

.....
..... (ලකුණු 10)

(vi) ඉහත අනුමාපනයට අදාළ pH වක්‍රයේ දල සටහනක් අඳින්න.

(ලකුණු 10)

(b) (i) $X_3Y_2(s)$ යෙහි සමතුලිතතා නියතය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියා දක්වන්න.


.....
..... (ලකුණු 05)

(ii) $X_3Y_2(s)$ හි ද්‍රාවතාව ගුණිතය K_{sp} නම් හා ද්‍රාව්‍යතාව $S \text{ mol dm}^{-3}$ සංතෘප්ත ද්‍රාවණයේ පවතින X හි අයනයේ සාන්ද්‍රණය සඳහා ප්‍රකාශයක් K_{sp} ඇසුරින් ලියා දක්වන්න.

.....
..... (ලකුණු 10)

(c) L හා M යන වාෂ්පශීලී ද්‍රව යුගලයෙන් සෑදි පරිපූර්ණ ද්‍රාවණයක් 1 atm බාහිර පීඩනයක් යටතේ 70 °C හිදී නැටීමට ලක්වේ නම් ද්‍රවයේ L හි මවුල ප්‍රතිශතය 75% ද M හි මවුල ප්‍රතිශතය 25% ක්ද වේ. ($P_L^0 > P_M^0$)

(i) L හා M අන්තර්ගත පද්ධතිය සඳහා උෂ්ණත්ව සංයුති කලාප සටහන පහත අක්ෂ තුළ ඇඳ නම් කරන්න.



(ලකුණු 15)

(ii) ඉහත ද්‍රාවණය සමග සමතුලිතව පවතින වාෂ්ප කලාපයේ සංයුතිය (Q) ඉහත සටහනේ නිරූපනය කරන්න. (ලකුණු 05)

(iii) ඉහත මිශ්‍රණය නැටවීම හා එයින් ලැබෙන වාෂ්පය සිසිල් කිරීම දිගින් දිගටම සිදු කළ විට ද්‍රවයේ තාපාංකයේ සිදුවන වෙනස පුරෝකථනය කරන්න.

.....

.....

.....

(ලකුණු 10)



www.iexamhub.com

Your Trusted Partner for Exam Success

Past Papers • Model Answers • Study Resources




04. (a) A, B, C යනු අණුක සූත්‍රය C_7H_{12} වන ව්‍යුහ සමාවයවික වේ. මේවා සියල්ල ප්‍රකාශ සමාවයවිකතාවය පෙන්වයි. A, B, C යන සංයෝග වෙන වෙනම $H_2 / Pd-BaSO_4$ ක්විනොලින් සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට පිළිවෙළින් D, E, F එල ලබා දෙන අතර මෙම එල තුනද ප්‍රකාශ සමාවයවිකතාවය පෙන්වයි. මින් D පමණක් පාරත්‍රිමාන සමාවයවිකතාවය පෙන්වයි. C A හි ස්ථාන සමාවයවිකයකි. A, B, C සංයෝග ඇමෝනියානු $AgNO_3$ සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට B සහ C සංයෝග පමණක් ඇමෝනියානු $AgNO_3$ සමග අවක්ෂේප ලබාදෙයි. A, $HgSO_4 /$ තනුක H_2SO_4 සමග ප්‍රතික්‍රියා කර G සහ H යන එල ලබා දෙන අතර B, $HgSO_4 /$ ත. H_2SO_4 සමග ප්‍රතික්‍රියාකර G පමණක් ලබා දෙයි.

- A, B, C, D, E, F, G සහ H යන ව්‍යුහයන් පහත කොටු තුල අඳින්න.

A	B
C	D
E	F
G	H

- (b) පහත ප්‍රතික්‍රියා අනුක්‍රමයෙහි P, Q, R, S, T, වලට අදාළ ව්‍යුහයන් සහ 1 - 4 දක්වා ප්‍රතිකාරක අදාළ ස්ථානයන්හි සටහන් කරන්න.



- ඉහත ප්‍රතික්‍රියා 1 - 4 අතුරින් තෝරා ගනිමින් පහත දක්වා ඇති එක් එක් ප්‍රතික්‍රියා වර්ගය සඳහා නිදසුනක් බැගින් ලබා දෙන්න.

I නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ

II ඔක්සිකරණය

(ලකුණු 31)

- (c) CCC=O සහ CH3MgCl අතර ප්‍රතික්‍රියාවේ ඵලය ලියා එහි යාන්ත්‍රණය දක්වන්න.

(ලකුණු 13)

ප්‍රශ්න 2 කට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

05. (a) (i) සම්මත දැලිස එන්තැල්පිය අර්ථ දක්වන්න.

(ලකුණු 10)

(ii) පහත දී ඇති රසායනික දත්ත භාවිතා කර 25°C හිදී CaO(s) හි උත්පාදන එන්තැල්පිය බෝන් හේබර් චක්‍රයක් මගින් ගණනය කරන්න.

$\text{O}_2(\text{g})$ හි බන්ධන විඝටන එන්තැල්පිය $= 498 \text{ kJmol}^{-1}$

O(g) හි පළමු ඉලෙක්ට්‍රෝනකරණ එන්තැල්පිය $= -149 \text{ kJmol}^{-1}$

O(g) හි දෙවන ඉලෙක්ට්‍රෝනකරණ එන්තැල්පිය $= 798 \text{ kJmol}^{-1}$

Ca(s) හි උෂ්ණද්ව්‍යාපනන එන්තැල්පිය $= 178 \text{ kJmol}^{-1}$


Ca(g) පළවන අයනීකරණ එන්තැල්පිය $= 590 \text{ kJmol}^{-1}$

Ca(g) හි දෙවන අයනීකරණ එන්තැල්පිය $= 1145 \text{ kJmol}^{-1}$

CaO(s) හි දැලිස එන්තැල්පිය $= 3414 \text{ kJmol}^{-1}$

(ලකුණු 60)

(b) චාලක රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් වලදී ඔබ අධ්‍යයනය කරනු ලබන පහත ප්‍රතික්‍රියාව සලකන්න.



ඉහත ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා 25°C හිදී $\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$ සාන්ද්‍රණය බලපෑම අධ්‍යයන සඳහා පහත වගුවේ පරිදි ප්‍රතික්‍රියක මිශ්‍ර කරන ලදී.

පරීක්ෂණය	1 නලය		2 නලය		1 නලය + 2 නලය ද්‍රාවණ නිල් පැහැ විමට ගතවන කාලය (තත්පර)
	ජලය cm^3	0.2 moldm^{-3} $\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$ ද්‍රාවණය cm^3	1 moldm^{-3} KI ද්‍රාවණ පරිමාව cm^3	පිෂ්ඨය සහිත 0.001 moldm^{-3} $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ cm^3	
1	-	25.0	10.0	15.0	5
2	5.0	20.0	10.0	15.0	6
3	10.0	15.0	10.0	15.0	8
4	15.0	10.0	10.0	15.0	12
5	20.0	5.0	10.0	15.0	25

(i) ඉහත පරීක්ෂණවලදී $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ එකම ප්‍රමාණයක් යොදා ගන්නේ ඇයි?

(ii) මෙම පරීක්ෂණයේදී පිෂ්ටයේ කාර්යය කුමක් ද?

(iii) Fe^{3+} ට සාපේක්ෂව පෙළ සොයන්න.

(iv) කාලයට එදිරිව $\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$ හි ලඝු අගය අතර ප්‍රස්ථාරයේ දළ සටහනක් අඳින්න.

(ලකුණු 30)

(c) 327°C ; $\text{CO(g)} + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH(g)}$

(i) ඉහත සමතුලිත පද්ධතිය සඳහා K_p හා K_c සඳහා ප්‍රකාශන ලියා දක්වන්න.

(ii) 8 dm^3 බඳුනක් තුළ $\text{H}_2(\text{g})$ 5 mol හා CO(g) 2 mol ඇතුළු කරමින් බඳුන සංවෘත කර 327°C උෂ්ණත්වයට පත් කරන ලදී.

සමතුලිත මිශ්‍රණයේ $[\text{CO(g)}]$ 0.2 moldm^{-3} වේ. නම් K_c අගය සොයා එනමින් K_p ගණනය කරන්න.

(iii) සමතුලිත මිශ්‍රණයේ මුළු පීඩනය කොපමණද?

(ලකුණු 50)

06. (a) (i) ව්‍යාප්ති සංගුණකය යනු කුමක් ද?
- (ii) න'නස්ට් ව්‍යාප්ති නියමය, යෙදීමේදී පැවතිය යුතු අවශ්‍යතා තුන ක් ලියන්න.
- (iii) B නැමති සංයුග්මක භෂ්මය ජලද්‍රාව්‍ය වන අතර X නැමති කාබනික ද්‍රාවණය තුළදී හොඳින් ද්‍රාවණය වේ. X හි දී B සංඝටනය හෝ විඝටනය නොවේ. ජලය හා X ද්‍රාවණය එකිනෙක සම්පූර්ණයෙන්ම අමිශ්‍ර වේ.
- 0.25 moldm⁻³ ජලීය B ද්‍රාවණයකින් 150 cm³ X ද්‍රාවණය 50 cm³ සමග හොඳින් සොලවා 25 °C දී ස්ථිර වෙන්වීමට තබා ඉන් පසු එම ස්ථර දෙක වෙන්කර ගන්නා ලදී. ජලීය ස්ථරයේ pH අගය 10 විය. 25 °C හිදී B හි විඝටන නියතය (K_p) 1×10^{-7} moldm⁻³ වේ.
- (i) ජලීය ස්ථරයේ OH⁻ අයන සාන්ද්‍රණය කොපමණද?
- (ii) ජලීය ස්ථරයේ B හි සාන්ද්‍රණය කොපමණද?
- (iii) 25°C හිදී ජලය හා X අතර B හි ව්‍යාප්ති සංගුණකය කොපමණද? (ලකුණු 100)

- (b) 20 °C උෂ්ණත්වයේදී MCrO_4 0.165 g ක නියැදියක් ආසුනු ජලය 100 cm³ සමග ප්‍රතිකාරක බෝතලයක් තුළ ඉතා හොඳින් සොලවන ලදී. එවිට ලැබෙන මිශ්‍රණයට 3×10^{-2} moldm⁻³ NaCl ද්‍රාවණ 100 cm³ එකතු කර පෙර ආකාරයටම හොඳින් සොලවන ලදී. මෙහිදී පැවති කහ අවක්ෂේපය දිය වෙමින් සුදු අවක්ෂේපයක් ලබාදුන් අතර ද්‍රාවණය කහ පැහැති විය. 20 °C හි දී.

$$\text{MCrO}_{4(s)} \text{ වල } K_{sp} = 2.8 \times 10^{-13} \text{ mol}^2 \text{dm}^{-6}$$

$$\text{MCrO}_{4(s)} \text{ වල ද්‍රාව්‍යතාව} = 4.5 \times 10^{-5} \text{ moldm}^{-3}$$


$$\text{MCl}_2(s) \text{ වල } K_{sp} = 1.7 \times 10^{-10} \text{ mol}^3 \text{dm}^{-9}$$

අවක්ෂේපය දියවන ආකාරය හා නව අවක්ෂේපය සෑදෙන ආකාරය ගණනය කිරීමක් ඇසුරින් පහදා දෙන්න.

(MCrO_4 මවුලික ස්කන්ධය 323 g mol⁻¹)

(ලකුණු 50)

07. (a)



$$E^0 \text{ A}^{2+}(\text{aq})/\text{A(s)} = -2.35 \text{ V} \quad E^0 \text{ B}^{3+}(\text{aq})/\text{B(s)} = +1.40 \text{ V}$$

අසංශුද්ධ Cu දණ්ඩක් පිරිසිදු කිරීම සඳහා භාවිතා වන y කෝෂය හා x කෝෂය සලකන්න.

- (i) (a) x හා y කෝෂ වර්ග හඳුන්වන නම් මොනවාද?

- (b) x හා y කෝෂ වර්ග අතර වෙනස්කම් තුනක් ලියන්න.

(ලකුණු 75)

- (ii) x කෝෂයේ, ඇනෝඩය හා කැතෝඩය හඳුනාගෙන ඇනෝඩ කැතෝඩ ප්‍රතික්‍රියා හා කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව ලියා දක්වන්න.
- (iii) x කෝෂයේ, විද්‍යුත් ගාමක බලය කොපමණද? (E^0_{cell})
- (iv) x කෝෂය සඳහා සම්මත කෝෂ අංකනය ලියා දක්වන්න.
- (v) මිනිත්තු 15 ක කාලයක් x කෝෂයේ විභවය නොවනස්ව පවතින පරිදි ඉහත ඇටවුම ක්‍රියාත්මක කළේ යැයි සිතන්න. y කෝෂයේ කුමණ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ ස්කන්ධය වැඩි වන්නේද? ඒ කොපමණ ප්‍රමාණයකින්ද? මිනිත්තු 15 තුළ ඇමීටරයේ පාඨාංකය 5 A වේ. ($\text{Cu} = 63.5 \text{ g mol}^{-1}$ $F = 96500 \text{ Cmol}^{-1}$)


(b)

A, B හා C යනු සංගත සංකීර්ණ සංයෝග වේ ඒවාට අෂ්ටතලීය ජ්‍යාමිතියක් ඇත. සියළුම සංයෝගවල මධ්‍ය ලෝහ අයනය T වන අතර සියළුම සංයෝග වලදී T හි ඔක්සිකරණ අවස්ථාව එකම වේ. ඉහත සෑම සංකීර්ණ සංයෝග තුළම NH_3 හා H_2O අණු මෙන්ම Br^- අයනද අන්තර්ගත වේ. Br^- අයන සහ සංයුජව මෙන්ම අයනීකවද බැඳී තිබිය හැකිය. A, B හා C සංකීර්ණ සංයෝගවල සංකීර්ණ කොටසෙහි අරෝපණ පිළිවෙළින් 0, +1 හා +2 වේ.

T හි කැටායනය අෂ්ටතලීය ජ්‍යාමිතියක් සහිතව NH_3 සමග සාදන සංකීර්ණය නිල් පැහැතිය.

- A හා C හි H_2O හා NH_3 සමාන මවුල අනුපාතයකින් අන්තර්ගතවේ.
 - B හි මවුලයක අන්තර්ගත වන්නේද A හි මවුලයක අන්තර්ගත H_2O මවුල ප්‍රමාණයම වේ.
- (i) සංකීර්ණ සංයෝග තුළ පවතින කැටායනය හඳුනාගෙන එහි ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ලියන්න.
- (ii) A, B හා C හි ව්‍යුහ සූත්‍ර ලියන්න.
- (iii) A හා C එකිනෙකින් වෙන්කර හඳුනාගන්නේ කෙසේද?
- (iv) A හි අන්තර්ගත H_2O හා NH_3 වෙනුවට $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ අයන ලිගන් ලෙස සම්බන්ධ වෙමින් නව සංකීර්ණ සංයෝගයක් සාදයි. එහි සංකීර්ණ කොටසෙහි ව්‍යුහය ඇඳ දක්වන්න.

$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ අයනයේ ව්‍යුහය පහත පරිදි වන අතර එහි සෑම ආරෝපිත ඔක්සිජන් පරමාණු දෙකෙන්ම මධ්‍ය ලෝහ අයනයක සංගත වී අෂ්ටතලීය ජ්‍යාමිතියක් සහිත සංකීර්ණයක් සෑදීමට දායක වේ.



(ලකුණු 75)



www.iexamhub.com


Your Trusted Partner for Exam Success

Past Papers • Model Answers • Study Resources




ප්‍රශ්න 2 කට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.


08. (a) බෙන්සීන් පහත දැක්වෙන ප්‍රතික්‍රියා අනුක්‍රමය භාවිතා කරමින් X සංයෝගය බවට පරිවර්තනය කරන ලදී.




P, Q, R, S, T, U, V සහ W යන සංයෝගවල ව්‍යුහ අඳිමින් හා ප්‍රතික්‍රියා 1 - 8 සඳහා ප්‍රතිකාරක, පහත දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් පමණක් තෝරා ගනිමින් ඉහත දී ඇති ප්‍රතික්‍රියා අනුක්‍රමය සම්පූර්ණ කරන්න.




(b) (i) පහත (05) නොවැඩි පියවර සංඛ්‍යාවක් භාවිතා කරමින් පහත පරිවර්තනය සිදු කරන්න.



(ii) මෙම පරිවර්තනය පියවර තුනකින් සිදුකරන්න.



(c) (i) පහත දැක්වෙන ප්‍රතික්‍රියාවේ X ඵලයෙහි ව්‍යුහය සහ එහි යන්ත්‍රණය දෙන්න.



(ii) 2-chloropropane ($\text{CH}_3)_2\text{CHCl}$) නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා සිදු කරන නමුත් ක්ලෝරෝ බෙන්සීන්

() නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා සිදු නොකරයි. මෙය පහදන්න. (ලකුණු 70)

09. (a) A නම් ජලීය ද්‍රාවණය තුළ කැටායන හතරක් අන්තර්ගතය. එම අයන හඳුනාගැනීමට සිදුකළ ප්‍රතික්‍රියා පටිපාටිය පහත දැක්වේ.

පරීක්ෂණය	නිරීක්ෂණය
1. මිශ්‍රණයේ ජලීය ද්‍රාවණයට තනුක HCl එක් කරන ලදී.	• සුදු පැහැ අවක්ෂේපය (P_1) ලැබුණි.
2. පෙරණයට H_2S වායුව බුබුලනය කරන ලදී.	• පැහැදිලි ද්‍රාවණයක් ලැබුණි
3. 2 න් ලැබුණු ද්‍රාවණය නටවා, එයට සාන්ද්‍ර HNO_3 එකතු කර යළි නටවා NH_4Cl හා NH_4OH එක් කරන ලදී.	• නිල් කොළ පැහැ අවක්ෂේපය (P_2) ලැබුණි.
4. 3 ලැබුණු පෙරණයට H_2S බුබුලනය කරන ලදී	• කළු පැහැ අවක්ෂේපය (P_3) ලැබුණි.
5. 4 න් ලැබුණු පෙරණය නටවා එයට $\text{NH}_4\text{Cl}/(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ එක් කරන ලදී.	• සුදු පැහැ අවක්ෂේපය (P_4) ලැබුණි.

ඉහත P_1, P_2, P_3 සහ P_4 සඳහා පහත පරීක්ෂණ සිදුකරන ලදී.

පරීක්ෂණය	නිරීක්ෂණය
P_1 - අවක්ෂේපයට තනුක NH_3 එකතු කරන ලදී.	අවර්ණ ද්‍රාවණය (S_1) ලැබුණි.
P_2 - වැඩිපුර තනුක $NaOH$ එක්කර H_2O_2 එකතු කරන ලදී.	කහපැහැති ද්‍රාවණය (S_2) ලැබුණි.
S_2 ට $BaCl_2$ ද්‍රාවණයක් එකතු කරන ලදී	කහපැහැති (P_3) අවක්ෂේපය ලැබුණි.
P_3 - තනුක අම්ලයක් එකතු කර ලැබෙන ද්‍රාවණයට වැඩිපුර NH_3 එකතු කරන ලදී	තද නිල් පැහැ ද්‍රාවණය (S_3) ලැබුණි.
P_4 - සාන්ද්‍ර HCl හි ද්‍රාවණය කර පහන් සිඵ පරීක්ෂාවට භාජනය කරන ලදී.	කොළ - කහ දැල්ලක් ලැබුණි.

- (i) A ද්‍රාවණයේ අන්තර්ගත කැටායන හතර හඳුනාගන්න.
- (ii) P_1, P_2, P_3, P_4 සහ P_5 අවක්ෂේප සහ S_1, S_2 සහ S_3 ද්‍රාවණවල වර්ණයන්ට හේතුවන රසායන විශේෂ හඳුනාගන්න.
- (iii) S_1, S_3 ද්‍රාවණවල අන්තර්ගත රසායනික විශේෂවල IUPAC නාම ලියන්න.
- (iv) P_3 අවක්ෂේපය සෑදීමට හේතුවන කැටායනය පරීක්ෂණය දෙකකදී අවක්ෂේප නොවීමට හේතුව පහදන්න. (ලකුණු 75)
- (b) S නම් ජලීය ද්‍රාවණයක SO_3^{2-} සහ $C_2O_4^{2-}$ අයන අන්තර්ගතය මෙම අයන සාන්ද්‍රණ නිර්ණය කිරීමට පහත පියවර අනුගමනය කරන ලදී.

පියවර 1

ද්‍රාවණයෙන් 25.00 cm^3 ක් වෙන් කර ආම්ලික තත්ත්ව යටතේ දෙන ලද $KMnO_4$ ද්‍රාවණයක් සමග සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්‍රියා කරවන ලදී. මෙහිදී ප්‍රතික්‍රියාව සම්පූර්ණ වීමට $KMnO_4$ ද්‍රාවණ 30.00 cm^3 වැය විය.

පියවර 2


පියවර 1 හි දී ලැබුණු ද්‍රාවණයට වැඩිපුර $BaCl_2$ ද්‍රාවණ පරිමාවක් එක් කරන ලදී. මෙහිදී තනුක HNO_3 හි අද්‍රාව්‍ය සුදු පැහැ අවක්ෂේපයක් ලැබුණි. අවක්ෂේපය වෙන්කර එහි වියළි ස්කන්ධය මැනගත් විට එය 0.699 g විය.

පියවර 3

පියවර 1 හි දී භාවිත කරන ලද $KMnO_4$ ද්‍රාවණය සාන්ද්‍රණය දන්නා $Na_2C_2O_4$ ද්‍රාවණයක් මගින් ප්‍රාමාණීකරණය කරන ලදී. සාන්ද්‍රණය 0.5 mol dm^{-3} $Na_2C_2O_4$ ද්‍රාවණ 25.00 cm^3 අනුමාපන ජලාස්කුවට ගෙන සාන්ද්‍රණය නොදන්නා $KMnO_4$ ද්‍රාවණය සමග අනුමාපනය කරන ලදී. මෙහි දී අනුමාපනය සඳහා $KMnO_4$ ද්‍රාවණ 100.00 cm^3 වැය විය.

- (i) පියවර 1 සහ 2 හි සිදුවන ක්‍රියාවලි සඳහා තුලිත අයනික/ රසායනික සමීකරණ ලියන්න.
- (ii) $KMnO_4$ ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය ගණනය කරන්න.
- (iii) පියවර 3 හි අනුමාපනයේ අන්ත ලක්ෂ්‍යයේ දී වර්ණ විපර්යාසය කුමක් ද?
- (iv) S ද්‍රාවණයේ අඩංගු SO_3^{2-} හා $C_2O_4^{2-}$ අයනවල සාන්ද්‍රණ සොයන්න.
- (v) $KMnO_4$ ද්‍රාවණයේ ප්‍රාමාණීකරණය කිරීමට හේතුව කුමක් ද? (ලකුණු 75)

10. (a) පහත දැක්වෙන්නේ කාර්මික ක්‍රියාවලි කිහිපයකින් නිපදවෙන ප්‍රධාන ඵලයක් වේ.



- (i) ඉහත එක් එක් ඵලයන් නිපදවීමට භාවිත කරන නිශ්පාදන ක්‍රියාවලිය හඳුන්වන නම් මොනවා ද?
- (ii) ඉහත ඒවායින් රසායනික ප්‍රභේද දෙකක් නිපදවීම සඳහා අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙසද ඉහත සංයෝග වලින් එකක් භාවිතා කරයි. නිපදවනු ලබන රසායනික ප්‍රභේද දෙක හා ඒ සඳහා භාවිත කරන අමුද්‍රව්‍යය ඉහත ලැයිස්තුවෙන් තෝරා ලියන්න.
- (iii) HNO_3 නිපදවීමේ ක්‍රියාවලියට අදාළ තුලිත රසායනික සමීකරණ අවශ්‍ය තැන් වලදී ප්‍රතික්‍රියා තත්වද සඳහන් කරමින් ලියා දක්වන්න.
- (iv) HNO_3 හි ප්‍රයෝජන දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 80)

විශ්ව පළාත්

அபிமான டேபார்ட்மென்டு/வடமேல் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்

2025

Provincial Department of Education - NWP

தீர்மானம் / விடைத்தாள் / ANSWER SHEET

தினாக்களம் 2025
13 செப்டம்பர் 2025
சென்னை

பெயர் Subject and Subject No.

ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်ဦးစီးချုပ်

I

மீடிகள்
மீடிகள்
Medium

නම
பெயர்
Name

- | | | Medium | | Name | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 01. (1) (2) (3) (4) (5) | 11. (1) (2) (3) (4) (5) | 21. (1) (2) (3) (4) (5) | 31. (1) (2) (3) (4) (5) | 41. (1) (2) (3) (4) (5) | |
| 02. (1) (2) (3) (4) (5) | 12. (1) (2) (3) (4) (5) | 22. (1) (2) (3) (4) (5) | 32. (1) (2) (3) (4) (5) | 42. (1) (2) (3) (4) (5) | |
| 03. (1) (2) (3) (4) (5) | 13. (1) (2) (3) (4) (5) | 23. (1) (2) (3) (4) (5) | 33. (1) (2) (3) (4) (5) | 43. (1) (2) (3) (4) (5) | |
| 04. (1) (2) (3) (4) (5) | 14. (1) (2) (3) (4) (5) | 24. (1) (2) (3) (4) (5) | 34. (1) (2) (3) (4) (5) | 44. (1) (2) (3) (4) (5) | |
| 05. (1) (2) (3) (4) (5) | 15. (1) (2) (3) (4) (5) | 25. (1) (2) (3) (4) (5) | 35. (1) (2) (3) (4) (5) | 45. (1) (2) (3) (4) (5) | |
| 06. (1) (2) (3) (4) (5) | 16. (1) (2) (3) (4) (5) | 26. (1) (2) (3) (4) (5) | 36. (1) (2) (3) (4) (5) | 46. (1) (2) (3) (4) (5) | |
| 07. (1) (2) (3) (4) (5) | 17. (1) (2) (3) (4) (5) | 27. (1) (2) (3) (4) (5) | 37. (1) (2) (3) (4) (5) | 47. (1) (2) (3) (4) (5) | |
| 08. (1) (2) (3) (4) (5) | 18. (1) (2) (3) (4) (5) | 28. (1) (2) (3) (4) (5) | 38. (1) (2) (3) (4) (5) | 48. (1) (2) (3) (4) (5) | |
| 09. (1) (2) (3) (4) (5) | 19. (1) (2) (3) (4) (5) | 29. (1) (2) (3) (4) (5) | 39. (1) (2) (3) (4) (5) | 49. (1) (2) (3) (4) (5) | |
| 10. (1) (2) (3) (4) (5) | 20. (1) (2) (3) (4) (5) | 30. (1) (2) (3) (4) (5) | 40. (1) (2) (3) (4) (5) | 50. (1) (2) (3) (4) (5) | |

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ
NAL ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ

புரட்சி கனம் கருணா / அறிவுறுத்தல்கள் பற்றி பதில்கள் பார்க்க / Please See the Other Side for Instructions.


I கருவே டிரி டெனது
பத்திரம் I தின மொத்தப்பயன்
Total Marks of Paper I

ව්‍යුහාත්මක රසායනය
(A කොටස)


01. (a) පහත දී ඇති එක් එක් ඉතාමත් සරල හෝ අසරල 60 සඳහන් කරන්න.
- (i) K, Se, Sr අතරින් ඉතාමත් සරල හෝ අසරලතම මූලාංගය හඳුන්වා දෙන්න. (ආරෝග්‍ය)
 - (ii) CCl_4 , CHCl_3 , CH_2Cl_2 අතරින් ඉතාමත් සරල හෝ අසරලතම මූලාංගය හඳුන්වා දෙන්න. (අධ්‍යාරෝග්‍ය)
 - (iii) CH_4 , H_2S හා H_2O අතරින් ඉතාමත් සරල හෝ අසරලතම මූලාංගය හඳුන්වා දෙන්න. (සාමාන්‍ය)
 - (iv) V^{3+} , Fe^{2+} , Cu^+ යන අයන අතරින් වැඩිම විචුම්බක ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවක් ඇත්තේ V^{3+} වේ. (අධ්‍යාරෝග්‍ය)
 - (v) 8 ඔක්ටිවෙත සැලකෙමින් ඉහත සඳහන් වූ සෑම මූලාංගයක්ම සරල හෝ අසරලතම මූලාංගයක් සහිතව ප්‍රමුඛ භාවිතයක් ඇතිව සඳහන් කරන්න. (අධ්‍යාරෝග්‍ය)

(ලකුණු 25)

(b) $[\text{C}_2\text{N}_2\text{O}_2\text{H}_2]^-$ අයනය සඳහා සැකිල්ල පහත ඇත්තේ.



(i) ඉහත අයන සඳහා වලංගුම පිළිගත හැකි ලිපි ව්‍යුහය අඳින්න.




(ලකුණු 03)

(ii) C පරමාණුවේ චන්ද්‍රිකාරණ අංකය හා වැඩිම ලිපි අක්ෂරය.

චන්ද්‍රිකාරණ අංකය +4 වැඩිම ලිපි අක්ෂරය නිලියා ත්‍රිකෝණාකාර (ලකුණු 02)

(iii) පහත දී ඇති ලිපි ව්‍යුහය සඳහන් කර ගනිමින් දී ඇති විද්‍යුත් සමතුලිත කරන්න.



	O_1	N_2	C_3	C_4	C_5
පරමාණුව වටා VSEPR සූත්‍රය	3	3	4	3	2
ඉලෙක්ට්‍රෝන සූත්‍රය සහිතව	ඉලෙක්ට්‍රෝන සූත්‍රය	ඉලෙක්ට්‍රෝන සූත්‍රය	ඉලෙක්ට්‍රෝන සූත්‍රය	ඉලෙක්ට්‍රෝන සූත්‍රය	ඉලෙක්ට්‍රෝන සූත්‍රය
පරමාණුව වටා වැඩිම	ඉලෙක්ට්‍රෝන සූත්‍රය	ඉලෙක්ට්‍රෝන සූත්‍රය	ඉලෙක්ට්‍රෝන සූත්‍රය	ඉලෙක්ට්‍රෝන සූත්‍රය	ඉලෙක්ට්‍රෝන සූත්‍රය
චන්ද්‍රිකාරණ අංකය	-2	+3	-1	+2	+3
ප්‍රමුඛතාවය	sp^2	sp^2	sp^3	sp^2	sp

(ලකුණු 24)

(iv) ඉහත (iii) කොටසෙහි ලිපි ව්‍යුහය සඳහන් කරගෙන සහ ඇත්තේ පරමාණු දෙක අතර 8 ඔක්ටිවෙත සැලකීම සහතික වන පරමාණුක ප්‍රමුඛ භාවිතයක් සඳහන් කරන්න.

- (i) $\text{O}_1 - \text{N}_2$ O_1 $sp^2/2p$ N_2 sp^2
- (ii) $\text{N}_2 - \text{C}_3$ N_2 sp^2 C_3 sp^3
- (iii) $\text{C}_3 - \text{C}_4$ C_3 sp^2 C_4 sp^3
- (iv) $\text{C}_4 - \text{C}_5$ C_4 sp^3 C_5 sp
- (v) $\text{C}_5 - \text{N}_7$ C_5 sp N_7 $sp/2p$

(ලකුණු 10)

(v) உயர்வு உ

(i) $O_1 - N_2$
 $C_6 - N_7$

(လေ့စွဲ ၀၄)

(vi)

$C_5 < C_3 < C_4 < C_6 < C_7$

$$\begin{array}{ccccccc} & & & \text{:O:} & & & \\ & & & || & & & \\ \text{H} & - & \ddot{\text{N}} & - & \ddot{\text{O}} & - & \text{C} & - & \ddot{\text{O}}: \\ & | & & & & & & & \\ & \text{H} & & & & & & & \end{array}$$

දිනින්න, ඒවායේ
ලෙස දක්වන්න.

$$\begin{array}{ccc} \text{H}-\ddot{\text{N}}-\ddot{\text{O}}-\ddot{\text{C}}=\ddot{\text{O}}: & \longleftrightarrow & \text{H}-\ddot{\text{N}}-\ddot{\text{O}}^+=\ddot{\text{C}}-\ddot{\text{O}}:^- \\ | & & | \\ \text{H} & & \text{H} \\ \text{உதாரணம்} & & \text{உதாரணம்} \end{array}$$
$$\begin{array}{c} \updownarrow \\ \text{H} - \text{N}^+ = \text{O}^+ - \text{C} - \text{O}^- \\ | \quad \quad | \quad \quad | \\ \text{H} \quad \quad \text{:O:}^- \quad \quad \text{:O:}^- \end{array}$$

ଅବସ୍ଥା ୨

(d)

(i)

$$\text{NO}_3^-$$

(ii)

BeCO₃

(iii)

$$\text{SO}_3^{2-}$$

- 03 -

02. (a) Y යනු රතු පැහැති සකස්කළ, එය හානි විශේෂයෙන්ම Cr_2O_3 හි පැහැය වල ප්‍රතික්ෂේපය හා සමාන වන Z නම් සහ සකස්කළ ලෝහයේ Y හි අන්තර්ගත ලෝහය ආවේණික, ආවේණික හා අවශේෂීය ලෝහ අන්තර්ගතය වැඩි. එම ලෝහය බරින් එකතු සන්තතිරණය අංකය සහිත එක්සත් ආරාමයක දෙසින් පැමිණේ.

(i) Y හඳුනාගන්න $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (05)

(ii) Z සහාන හඳුනාගන්න Cr_2O_3 (05)

(iii) Y හි හානි විශේෂයෙන්ම සඳහා කුලිත රසායනික සමීකරණය ලියන්න. (06)

$$(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \longrightarrow \text{N}_2 + \text{Cr}_2\text{O}_3 + 4\text{H}_2\text{O}$$

(iv) Y හි අන්තර්ගත ලෝහය විශිෂ්ට සඳහා සන්තතිරණය රසායනික සූත්‍ර, සන්තතිරණය අංක සහ ආවේණික, ආවේණික, අවශේෂීය සන්තතිරණය දක්වන්න.

සන්තතිරණය රසායනික සූත්‍රය	සන්තතිරණය අංක	ආවේණික, ආවේණික, අවශේෂීය සන්තතිරණය
CrO	+2	දුනල නිෂ්පාදන
Cr_2O_3	+3	නිෂ්පාදන
CrO_2	+4	දුනල අවශේෂීය
CrO_3	+6	අවශේෂීය

(12x2)
24

(v) දුනල ලෝහය අන්තර්ගත සන්තතිරණය අනුපාතය දෙසින් රසායනික සූත්‍ර සහ ජලය ආවේණිකව රසායනික සූත්‍ර දක්වන්න. (1x4=04)

(i) සූත්‍රය CrO_4^{2-} ජලය නිෂ්පාදන

(ii) සූත්‍රය $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ජලය කැබ්ලි

(vi) Y හානි විශේෂයෙන්ම දී පිටවන වායුවේ වලංගු දුනල අවශේෂීය දී Mg සමග ප්‍රතික්ෂේපය X නම් සංයෝගය වේ. X ජලයට සෙද වී P නම් අවශේෂීය හා R නම් වායුව වේ.

(a) X, P, R හඳුනාගන්න.


X Mg_3N_2

P $\text{Mg}(\text{OH})_2$

R NH_3

(2x3=6)

(b) X ජලය සමග ප්‍රතික්ෂේපය සඳහා කුලිත රසායනික සමීකරණය ලියන්න.



(c) R වායුව හඳුනා ගැනීමේ රසායනික සමීකරණය ලියන්න.

තෙත්ලිප්පුරිකාරකය හෙවත් වෙනත් ක්‍රමයක් ද්‍රව්‍ය (වැඩිපමණක්) ඇතිව
හෝ
හා HCl කැබ්ලි විද්‍යාත්මකව අවශේෂීය ප්‍රතික්ෂේපයක් වේ
හෝ
තෙත්ලිප්පුරිකාරකය නිල් පැහැයක් ගනී (05)

(b) A B C D E ප්‍රතික්රියා කළ හැකි පදාර්ථයන් සහ ඒවායේ අයුරු ලෙස ලියා ඇත.

ප්‍රතික්රියා	ප්‍රතික්රියා	ප්‍රතික්රියා
1. A	• Na_2SO_4 සහ BaCl_2 සමඟ ප්‍රතික්රියා කරයි.	• H_2SO_4 සහ BaCl_2 සමඟ ප්‍රතික්රියා කරයි.
2. B	• NH_4OH සමඟ ප්‍රතික්රියා කරයි.	• NH_4OH සමඟ ප්‍රතික්රියා කරයි.
3. C	• NaOH සමඟ ප්‍රතික්රියා කරයි.	• NaOH සමඟ ප්‍රතික්රියා කරයි.
4. D	• K_2SO_4 සමඟ ප්‍රතික්රියා කරයි.	• K_2SO_4 සමඟ ප්‍රතික්රියා කරයි.
5. E	• AgNO_3 සමඟ ප්‍රතික්රියා කරයි.	• AgNO_3 සමඟ ප්‍රතික්රියා කරයි.

(i) A සහ E ද්‍රව්‍ය වල සංයුතිය හඳුනා ගන්න.

A. Na_2SO_4

B. $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$





C. MnSO_4

D. BaCl_2

E. AgBr


(3x5=15)

(ii) පහත දැක්වූ සමතුලිත සමීකරණ සඳහා සමතුලිත සමීකරණ ලියන්න.




(4x3=12)

(iii) A සංයුතිය ලබාදෙන වායුව සහ $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ අතර ප්‍රතික්රියා සමීකරණ ලියන්න.



(06)


(iv) 2 සහ 5 සමතුලිත සමීකරණ ලියන්න.



(3x2=06)

(a) HA සහ $K_a = 1.9 \times 10^{-5}$ වන ඒක ප්‍රමාණයක් ඇති 0.1 mol dm⁻³ HA ද්‍රාවණයක් 25.00 cm³ අඩුපාටන ද්‍රාවණයක් සමඟ මිශ්‍ර කරනු ලබන විට 0.15 mol dm⁻³ NaOH ද්‍රාවණයක් සමඟ අනුමාන කරන ලදී.

(i) HA(aq) හි විභාජන සමීකරණය ලියා K_a සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.



$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA(aq)}]}$$

(03)


(ii) pH του HAc(aq) είναι μικρότερο από του pH του $\text{CH}_3\text{COONa(aq)}$.

(03) $1.9 \times 10^{-5} = \left(\frac{[\text{H}^+][\text{Ac}^-]}{[\text{HAc}]}} \right) \quad \text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+] \quad (03)$


(03) $1.9 \times 10^{-8} = \left[\text{H}^+ \right]_{\text{eq}} \quad \text{pH} = -\log_{10} \left[\text{H}^+ \right]_{\text{eq}} \quad (03)$

(03) $[H^+]_{(aq)} = 1.38 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$ $pH = -\log(1.38 \times 10^{-3})$
 $pH = 2.86$ //

(iii) $\text{HCl(aq)} + \text{NaOH(aq)} \rightarrow \text{NaCl(aq)} + \text{H}_2\text{O(l)}$ (05)




$110 \text{ MPa} = 0.1 \times 10^3 \times 25 = 2.5 \times 10^3 \text{ MPa}$ (03) $\sqrt{110000}$
 $K_p = \frac{A_{\text{area}}}{A_{\text{area}}}$ (03)

$$\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}^+\text{aq} + \text{HCO}_3^-\text{aq} \quad (0.1)$$


(v) ಸಹಸ್ರಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ NaOH ದೊರಕಲು ಬೇಕೆಂದು 10 cm ವರ್ಗ, 1 m ಎತ್ತರದ ಘನ NaOH ಗಾಂಧೀ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅದರ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ? (93)


$\alpha = 5.62 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$

සමාන ලද්දේ පමණ NaOH 10 cm^3 හකුළු තුළ වී ලැබේ හා භාජනය කරයි (03)
 ලැබේ හා විච්ඡේදනය කර ලැබේ $[\text{H}^+]$ ගුණානුපාතය NaOH හි විච්ඡේදනය කරන pH
 සේවී. $[\text{OH}^-] = 0.029 \text{ mol dm}^{-3}$ (04)
 $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$
 $\text{pOH} = 1.5376$ $\text{pH} = 12.4624$ (05)




$[OH^-] = 0.029 \text{ mol dm}^{-3}$
 $pOH = 1.5376$ $pH = 12.4624$
 pH වියයුතු සංඛ්‍යාවක් ලෙස දෙකකින් දෙකකින්.


(vi) ලහන අනුමාපනයට අදාළ $pOH = 1.5510$ වනුයේ දී සම්පන්න අයිතිය



(b) (i) $X_3Y_2(s)$ සෙහි සම්පූර්ණ නියතය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියා දක්වන්න.



(ii) $X_3Y_2(s)$ හි ද්‍රාව්‍යතාව K_{sp} නම් හා ද්‍රාව්‍යතාව $S \text{ moldm}^{-3}$ සාපේක්ෂ ද්‍රාව්‍යතාව පවතින X හි අයනවශයෙන් සෑදෙන ප්‍රකාශයක් K_{sp} ඇසුරින් ලියා දක්වන්න.




$$K_{sp} = (3s)^3 (2s)^2 (0.3)$$

$$K_{\text{эр}} = 108 \text{ } \text{г}^5 \quad - 06 -$$

$$[X^{2+}_{Caq}] = 3 \left(\frac{K_{sp}}{108} \right)^{1/5} \quad (03)$$

- (c) L හා M හෝ T_M දී පාලනයන් සඳි වෙනස් වන්නේ 1 atm වායු පීඩනයේ යටතේ 70°C හි තැබීමට ලක්වී තිබේ. L හි දී M හි දී පීඩනය 752 ද M හි දී පීඩනය 252 ක් වේ. ($P^M_L = P^M_M$)
- (d) L හා M අන්තර්ගත සංයුතිය සඳහා ද්විතීයික සංයුතිය සලකා ගත්තේ අන්තර්ගත අගය වන බැවින් නිසි වන්නේ.



(10)









- (iii) අන්තර්ගත සංයුතිය සලකා ගත්තේ අන්තර්ගත අගය වන බැවින් නිසි වන්නේ.
- (iii) අන්තර්ගත සංයුතිය සලකා ගත්තේ අන්තර්ගත අගය වන බැවින් නිසි වන්නේ.

• වඩා වැඩි L දිගින් දිගටම වැඩි වී වැඩි වැඩියාවක් වන බවට පත්වීම M වැඩි වේ.


• අන්තර්ගත අන්තර්ගත අගය වන බැවින් නිසි වන්නේ. (03)

04. (a) A, B, C යනු අනුමාන සූත්‍රය C_6H_{12} වන වලාන සමානවෘත්ත ද්‍රව්‍ය. එමගින් Br_2 ද්‍රව්‍යය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි. A, B, C යන සමානවෘත්ත ද්‍රව්‍යයන් H_2 / $Pd-H_2SO_4$ සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි. එමගින් Br_2 ද්‍රව්‍යය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි. D, E, F, G යනු අනුමාන සූත්‍රය C_6H_{12} වන වලාන සමානවෘත්ත ද්‍රව්‍ය. එමගින් Br_2 ද්‍රව්‍යය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි. A, B, C යන සමානවෘත්ත ද්‍රව්‍යයන් $AgNO_3$ සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි. D, E, F, G යන සමානවෘත්ත ද්‍රව්‍යයන් $AgNO_3$ සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි. A, B, C යන සමානවෘත්ත ද්‍රව්‍යයන් H_2SO_4 සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි. D, E, F, G යන සමානවෘත්ත ද්‍රව්‍යයන් H_2SO_4 සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි. A, B, C යන සමානවෘත්ත ද්‍රව්‍යයන් H_2SO_4 සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි. D, E, F, G යන සමානවෘත්ත ද්‍රව්‍යයන් H_2SO_4 සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

A, B, C, D, E, F, G හා H යන වලාන සමානවෘත්ත ද්‍රව්‍ය අතින්.




(6 x 8 = 48)



- ඉහත ප්‍රතික්‍රියා 1 - 4 අතුරින් කවරා ගනිමින් සහන දක්වා ඇති එක් එක් ප්‍රතික්‍රියා වර්ගය සඳහා විද්‍යුත් චුම්බක වැටුප් ලබා දෙන්න.


I විද්‍යුත් විචුම්බක ආදායම 4
 II විද්‍යුත් විචුම්බක 2

(2 x 2 = 4)



)

(iii)



(05)

20


5 (a) 65

b) i) අයනීය ජීවය සහන හල්ජලාය ලබා දෙන්නේ අයනීය භාජිතය $1 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$ වන අයන දී ය. මෙම ප්‍රතික්‍රියාවේදී සංශුද්‍ර ආයනීය භාජිතය ඉස්මත වේ. අනෙක හල්ජලාය වටා ගතවන කාලය මෙහි ගණනය කරන්න. මේ නිසා ප්‍රතික්‍රියා කිසියම් ප්‍රමාණයකට පිළවන තුරු සුදුසු I_2 ඉවත් කළ යුතුය. මේ නිසා වාතයට නිසි $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ප්‍රමාණයක් සහතු කරයි. අනෙක් සුදුසු I_2 ඉවත්වන ඉවත් කරයි. (10)


ii) ජීවය සුදුසු I_2 සහන ක්‍රියාකර තද හල්ජලාය ලබා දේ. මෙහි ප්‍රතික්‍රියාව සම්පූර්ණ වීමට ගතවූ කාලය මෙහි ගණනය කරන්න. (05)


iii) මුළු ස්වභාව නිසි නිසා $[\text{Fe}^{3+}_{\text{aq}}] \propto V$ ලෙස සලකන්න.

Fe^{3+} අනුප්‍රාප්තයෙන් ප්‍රතික්‍රියාවේ පෙළ m වන,
 $[\text{Fe}^{3+}_{\text{aq}}]^m \propto V^m_{\text{Fe}^{3+}}$




ප්‍රතික්‍රියා අනුප්‍රාප්ත Fe^{3+} අනුප්‍රාප්තය පෙළ : 1 නි: (05)





(i) $K_p = \frac{P_{\text{CH}_3\text{OH(g)}}}{P_{\text{CO(g)}} + (P_{\text{H}_2\text{(g)}})^2}$ (05)

$K_c = \frac{[\text{CH}_3\text{OH(g)}]}{[\text{CO(g)}][\text{H}_2\text{(g)}]^2}$ (05)



අර්ථස්ථාන මුද්‍රාව	2	5	—	mol
අර්ථස්ථාන භාගය	$\frac{2}{8}$	$\frac{5}{8}$	—	mol dm^{-3}
	0.25	0.625	—	mol dm^{-3}

ඵලය (මුද්‍රාව)	0.2	0.525	0.05	mol dm^{-3} (05)
----------------	-----	-------	------	---------------------------

$K_c = \frac{[\text{CH}_3\text{OH(g)}]}{[\text{CO(g)}][\text{H}_2\text{(g)}]^2}$

$K_c = \frac{0.05 \text{ mol dm}^{-3}}{0.2 \text{ mol dm}^{-3} \times (0.525 \text{ mol dm}^{-3})^2}$ (05)

$K_c = 0.907 \text{ mol}^{-2} \text{ dm}^3 //$ (04 + 1)

$K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$ (03) $\Delta n = -2$ (02)

$K_p = 0.907 \times 10^{-6} \text{ mol}^{-2} \text{ m}^3 (8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 600 \text{ K})^{-2}$ (05)

$K_p = \frac{0.907 \times 10^{-6}}{(8.314 \times 600)^2} \text{ Pa}^{-2}$

$K_p = 3.64 \times 10^{-1} \times 10^{-6} \times 10^{-7}$

$K_p = 3.64 \times 10^{-14} \text{ Pa}^{-2} //$ (04 + 01)

(iii) ଘରର ବାୟୁର ସଂକ୍ଷେପନ ଗୁଣ 2.0

$$pV = nRT$$

$$n_T = n_{CO} + n_{H_2} + n_{CH_3OH}$$

$$n_T = 1.6 + 4.2 + 0.4 \text{ mol}$$

$$n_T = 6.2 \text{ mol} \quad (02)$$

$$p = \frac{6.2 \text{ mol} \times 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 600 \text{ K}}{8 \times 10^{-3} \text{ m}^3} \quad (03)$$


$$p = 3.87 \times 10^6 \text{ Pa} \quad (04+01)$$

ii

$$(05 \times 3) = 15$$

iii) අර්ථකයේ දී ආනත කළ B ප්‍රභල (ඵලය ස්ථරයක්) = $0.25 \times 150 \times 10^{-3} \text{ mcl}$
 = 0.0375 mcl (05)

II ശ്ലേഷ്മാർക്കു $pH = 10$ $\therefore [OH^-]_{aq}] = 1 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$ (05)
 $\therefore pOH = 4$ (05)



$$K_p = \frac{[BH^+aq][OH^-aq]}{[Baq]} \quad (05)$$

$$1 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3} = \frac{(1 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3})^2}{[B : \text{caq}]} \quad (03)$$

$$[B(aq)] = \frac{10^{-8}}{10^{-7}} = 0.1 \text{ mol dm}^{-3} \quad (0.5)$$

III. கொடுக்கப்பட்ட $n_B = 0.1 \times 150 \times 10^{-3} = 15 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (05)

X ലിതറുടെ $n_B = (0.0375 - 0.015) \text{ mol}$.

$$= 0.0225 \text{ mol} \quad (0.3)$$

$$[B]_{(x)} = \frac{0.225 \text{ mol}}{50 \times 10^{-3} \text{ dm}^3} = 0.45 \text{ mol dm}^{-3} \quad (05)$$

(04)

$$(05) \quad K_D = \frac{[B(aq)]}{[B(x)]} = \frac{0.1 \text{ mol dm}^{-3}}{0.45 \text{ mol dm}^{-3}} = 0.222 \quad (05)$$

6(a) 75

$$\left. \begin{array}{l} \text{අනුමාන ලද 100 cm}^3 \text{ මුළු ද්‍රාවණය } \text{MClO}_4 \\ \text{ඝනත්වය} \end{array} \right\} = 4.5 \times 10^{-5} \times 100 \times 10^{-3} \times 322.3 \text{ g}$$

$$= 1.454 \times 10^{-3} \text{ g.}$$

මෙය ආරම්භයේ දී භාවිත කළ MClO_4 ඝනත්වයට වඩා අඩු නිසා MClO_4 අතිරේක වේ. (15)


$$\text{NaCl වෙන් ලැබෙන } \text{Cl}^- \text{ මුළු ප්‍රමාණය} = 3 \times 10^{-2} \times 100 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$= 300 \times 10^{-5} \text{ mol.}$$

$$[\text{Cl}^-]_{\text{aq}} = \frac{300 \times 10^{-5} \text{ mol}}{200 \times 10^{-3} \text{ dm}^3}$$

$$= 1.5 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$$

MCl_2 අතිරේක වීමට ආරම්භයේ $[\text{M}^{2+}]_{\text{aq}}$



$$K_{sp} = [\text{M}^{2+}]_{\text{aq}} [\text{Cl}^-]_{\text{aq}}^2$$
 (05)

$$1.7 \times 10^{-10} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9} = [\text{M}^{2+}]_{\text{aq}} (1.5 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3})^2$$

$$[\text{M}^{2+}]_{\text{aq}} = \frac{1.7 \times 10^{-10}}{2.25 \times 10^{-4}}$$
 (05)

$$= 0.756 \times 10^{-6}$$

$$= 7.56 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$= 7.56 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$$
 (05)

$$\text{MClO}_4 \text{ සංතෘප්ත ප්‍රමාණයේ } [\text{M}^{2+}]_{\text{aq}} = 4.5 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$$
 (07)

MCl_2 අතිරේක වීමට ආරම්භයේ $[\text{M}^{2+}]$ වඩා වැඩි වීමට අවශ්‍ය වේ. (10)

6(b) 75

7. a)

- i) a) x - ലിഥിയം അയോൺ / ലിഥിയം അയോൺ / ലിഥിയം അയോൺ (05)
 y - ലിഥിയം അയോൺ (05)

b) ലിഥിയം അയോൺ

ലിഥിയം അയോൺ

• അയോൺ അയോൺ $\rightarrow$ ലിഥിയം അയോൺലിഥിയം അയോൺ $\rightarrow$ അയോൺ അയോൺ

• ലിഥിയം അയോൺ redox പ്രതിപ്രവർത്തനം

ലിഥിയം അയോൺ അയോൺ പ്രതിപ്രവർത്തനം

• ലിഥിയം (-) അയോൺ


ലിഥിയം (+) അയോൺ

• ലിഥിയം (+) അയോൺ


ലിഥിയം (-) അയോൺ

(02 x 3 = 06)

ii) Anode - (A) (03)




cathode - (B) (03)




$$iii) E_{cell}^{\circ} = E_{cathode}^{\circ} - E_{anode}^{\circ} \quad (04)$$

$$= 1.40V - (-2.35V) \quad (04)$$

$$= 3.75V \quad (3+1)$$



ii) അയോൺ പ്രതിപ്രവർത്തനം (02)



അയോൺ പ്രതിപ്രവർത്തനം,

$$Q = It \quad (01)$$

$$Q = 5 A \times 180 \times 60 s$$


$$= 4500 C \quad (02)$$

$$\text{Weight of Cu deposited} = \frac{63.5 g \times 4500 C}{96500 \times 2 C} \quad (04)$$

$$= 1.48 g \quad (04)$$

7(a) 75


b)

i Ni^{2+} (10)ii A $[Ni(Br)_2(NH_3)_2(H_2O)_2]$ (10)B $[Ni(Br)(NH_3)_3(H_2O)_2]Br$ (10)C $[Ni(NH_3)_3(H_2O)_3]Br_2$ (10)

iii A හා C දෙක සමාන $AgNO_3$ ද්‍රව්‍යයක් සහිත කරන විට A හි දී පමණක් ක්‍රියා NH_3 හි ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුවන බව පෙන්වා දිය යුතුය. A හි ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුවන බව පෙන්වා දිය යුතුය. (15)

(මෙම ප්‍රතික්‍රියාව පෙන්වා දිය යුතුය)

iv








(10)


7(b) 75

(08)







(07)








ഊർജ്ജം 3




Q





(02) andra Printers



R







a) 60



නුමුණ NaOH








පිළිවෙල Δ



(04)

(05)

(e. 25)



(05)

(e. 20)

(08)


Samudra Printers

c1ccccc1[N+](=O)[O-] (X) (O₄)


$$\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{HONO}_2 \longrightarrow \underset{\text{(ol)}}{\text{HSO}_4^-} + \underset{\text{(ol)}}{\text{H}-\overset{+}{\text{O}}(\text{H})-\text{NO}_2}$$

$$\downarrow$$

$$\text{(oz)} \quad \quad \quad \text{+ NO}_2 \quad \text{+ H}_2\text{O}$$

$$\text{(oz)} \quad \quad \quad \text{(oz)} \quad \quad \quad \text{(oz)}$$

$$\text{ii} \quad \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{Cl} \\ | \\ \text{H} \end{array}$$

2-chloropropane හිදී C-Cl බන්ධනයේ $\overset{\delta+}{C}-\overset{\delta-}{Cl}$ ලෙස ධ්‍රැවීකරණය වේ.
 නිෂ්ප්ලේඛකයක් මගින් ප්‍රතික්‍රියා කරයි. $\overset{\delta+}{C}-\overset{\delta-}{Cl}$ හි ධ්‍රැවීකරණය නිසා Cl^- (02)
 මුක්ත වේ. නිෂ්ප්ලේඛකයේ ආදේශන ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුවේ. මෙම ආදේශනය නිසා ඵ්‍රකාරය
 (පිළිබඳව) තවදුරටත් විස්තරය හා ප්‍රතික්‍රියා නිමැවීම වන විෂයය. (02)



chlorobenzene හි සම්පූර්ණ වලින් $\text{Cl}-\text{C}$ බන්ධනයට සම්පූර්ණයෙන්ම ද්විත්ව
 බන්ධන ලකුණ ලැබෙන නිසා $\text{C}-\text{Cl}$ බන්ධනය වඩා ශක්තිමත් වේ. (O^-) (O)
 වේ නිසා $\text{C}-\text{Cl}$ බන්ධනය බිඳීම දුෂ්කර නිසා chlorobenzene නිශ්ක්රීයකරණයට ප්‍රතික්‍රියාව
 නොපෙන්වයි. (O^-) (O) Samudra Printers C-II - 25

Samudra Printers

C-11 - 25

$$); Ag^+, Cr^{3+}, Ni^{2+}, Ba^{2+} \quad (5 \times 4 = 20)$$

$P_1 = AgCl$ in

$$P_2 - Cr(OH)_3$$

$P_3 - Ni_3S$

 $(4 \times 5 = 20)$
$$P_4 - BaCO_3$$
$$P_5 - BaCrO_4$$

S₁ - $[Ag(NH_3)_2]^+ Cl^-$ / $[Ag(NH_3)_2]^+$ (4 x 3 = 12)

$$S_2 - CrO_4^{2-} / Na_2CrO_4$$
$$S_3 - [Ni(NH_3)_6]^{2+}$$

ii. Si diamminesilver(I) chloride / diamminesilver(I) ion I_m
 S_3 hexaamminenickel(II) ion. $(2 \times 5 = 10)$

53 hexaamminenickel(II) ion.

$$(2 \times 5 = 10)$$
$$\begin{array}{l} \text{v} \quad \text{H}_2\text{S (aq)} \rightleftharpoons \text{HS}^- \text{(aq)} \quad - (1) \quad (02) \\ \quad \text{HS}^- \text{(aq)} \rightleftharpoons \text{S}^{2-} \text{(aq)} + \text{H}^+ \text{(aq)} \quad - (2) \quad (02) \end{array}$$
[illegible]





$\text{H}_2\text{S}(\text{aq}) \rightleftharpoons 2\text{H}^+(\text{aq}) + \text{S}^{2-}(\text{aq})$

අනුප $\text{S}^{2-}(\text{aq})$ ආශ්‍රිතව අඩුවන නිසා මෙම ආරාමය අඩුවෙන්නේ වීමට $\text{S}^{2-}(\text{aq})$ ආශ්‍රිතව ප්‍රමාණවත් නොවේ. මේ නිසා ආලේඛන උපද්‍රව $\text{S}^{2-}(\text{aq})$ ආශ්‍රිතව අඩු වී යන ආකාරයෙන් දී අඩුවෙන්නේ.

(09)

q. b 75

RICHARD



අනුමාන කරන ලද $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ප්‍රමාණය = $0.5 \text{ mol dm}^{-3} \times 25.00 \times 10^{-3} \text{ dm}^3$
 $= 12.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (03)

ප්‍රතික්‍රියා කරන KMnO_4 ප්‍රමාණය = $\frac{2 \times 12.5 \times 10^{-3} \text{ mol}}{5}$
 $= 5 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (03)

$[\text{KMnO}_4] = \frac{5 \times 10^{-3} \text{ mol}}{100 \times 10^{-3} \text{ dm}^3} = \underline{0.05 \text{ mol dm}^{-3}}$ (03)

iii අර්ථය $\rightarrow$ ලා සේන (03)

iv SO_3^{2-} ආක්ෂිප්තය සෙවීම. (03)

අනුමාන කරන ලද BaSO_4 ප්‍රමාණය = $\frac{0.699 \text{ g}}{233 \text{ g mol}^{-1}}$ (02). $M_{\text{BaSO}_4} = 233 \text{ g mol}^{-1}$

$= 3 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (03)

v SO_4^{2-} ප්‍රමාණය = SO_3^{2-} ප්‍රමාණය (03)

$\therefore \text{SO}_3^{2-}$ ප්‍රමාණය = $3 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (03)

SO_3^{2-} ආක්ෂිප්තය = $\frac{3 \times 10^{-3} \text{ mol}}{25 \times 10^{-3} \text{ dm}^3} = \underline{0.12 \text{ mol dm}^{-3}}$ (04)

RICHARD

$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ සාන්ද්‍රණය සෙවීම.

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) ප්‍රභව 25.00 cm}^3 \text{ මූලද්‍රව්‍ය } \text{SO}_3^{2-} \text{ හා} \\ \text{C}_2\text{O}_4^{2-} \text{ සහ ප්‍රතික්‍රියා කළ KMnO}_4 \text{ මවුල} \end{array} \right\} = 0.05 \text{ mol dm}^{-3} \times 30 \times 10^{-3} \\ = 1.5 \times 10^{-3} \text{ mol (03)}$$

$$\begin{aligned} \text{SO}_3^{2-} \text{ ද්‍රව්‍ය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කළ KMnO}_4 \text{ මවුල} &= \frac{2}{5} \times 3 \times 10^{-3} \text{ mol (03)} \\ &= 1.2 \times 10^{-3} \text{ mol (03)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{C}_2\text{O}_4^{2-} \text{ ද්‍රව්‍ය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා වීමට ද්‍රව්‍ය KMnO}_4 \text{ මවුල} &= (1.5 \times 10^{-3} - 1.2 \times 10^{-3}) \text{ mol (03)} \\ &= 0.3 \times 10^{-3} \\ &= 3 \times 10^{-4} \text{ mol (02)} \end{aligned}$$

$$[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = \frac{3 \times 10^{-4} \text{ mol}}{25 \times 10^{-3} \text{ dm}^3} \quad (02)$$

$$= \underline{0.012 \text{ mol dm}^{-3}} \quad (04)$$

9 b) 75

a)

- i
- | | | |
|--------------------------|---|----------------|
| HNO_3 | - | മെർക്യൂറി മൂലം |
| H_2SO_4 | - | ഡൈനാമിക് മൂലം |
| NH_3 | - | മെർക്യൂറി മൂലം |
| Na_2CO_3 | - | മെർക്യൂറി മൂലം |


(1x4 = 4)

ii കോശിത കോശിത - HNO_3 മൂലമൂലം - NH_3

(03)

 Na_2CO_3 (2x4 = 08)

iii




(05)

- NH_3 ജ്വലന മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വാതക മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന 9-12 ശതമാനം വാതക


(06)

2 NO 800 - 850°C ഉണ്ടാകുന്നു


- Pt/Rh ഉപയോഗിക്കുന്നു




(05)



(05)



(05)



(05)

ഉണ്ടാകുന്നു

(02)

പോലീസ് ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തുന്നു

അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വെടിയുണ്ടാകുന്നു

അയാളുടെ കയ്യിൽ

ഒരു വെടിയുണ്ടാകുന്നു

(3x2 = 06)

(0-70)

[illegible]

බිංදු සහිතව පිළිගත් පිටපතක් ලෙස පිටපත් කර ගන්න. (2 x 6 = 12)

iii) රජය විසින් නිදහස්ව සොයා ගන්නා බොහෝමයක් පුනර්ජනනය නොවන සම්පත් වලින් සෑදී නිකුත් වේ රජය බොහෝමයක් නිදහස ආවරණ නිදහස ලැබෙන රේඛාව 100% පුනර්ජනනය සහිතව නිකුත් වන නිසා ජර්ශය ආවරණ ප්ලාස්ටික් ($E \times 4 = 0.8$)

$$(4 + 4)$$